

表 2709 糖尿病の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	23,508 (38.4)	37,681 (61.6)	61,189 (100.0)	8,186	4	69,379
2年～ (%)	25,607 (36.8)	44,045 (63.2)	69,652 (100.0)	8,983	3	78,638
5年～ (%)	28,026 (40.9)	40,416 (59.1)	68,442 (100.0)	9,359		77,801
10年～ (%)	18,433 (54.0)	15,681 (46.0)	34,114 (100.0)	5,946		40,060
15年～ (%)	12,929 (73.2)	4,741 (26.8)	17,670 (100.0)	3,885		21,555
20年～ (%)	8,232 (85.7)	1,371 (14.3)	9,603 (100.0)	2,428		12,031
25年～ (%)	4,794 (91.4)	451 (8.6)	5,245 (100.0)	1,485		6,730
30年～ (%)	2,880 (93.6)	196 (6.4)	3,076 (100.0)	841		3,917
35年～ (%)	1,530 (94.0)	98 (6.0)	1,628 (100.0)	468		2,096
40年～ (%)	476 (95.6)	22 (4.4)	498 (100.0)	119		617
合計 (%)	126,415 (46.6)	144,702 (53.4)	271,117 (100.0)	41,700	7	312,824
不明 (%)	51 (23.3)	168 (76.7)	219 (100.0)	173		392
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
平均	9.40	5.03	7.07	8.90	1.29	7.31
標準偏差	8.87	4.84	7.34	8.63	1.11	7.55

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査