

表 2710 糖尿病の有無 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	63,033 (86.8)	9,616 (13.2)	72,649 (100.0)	20,698		93,347
慢性腎孟腎炎 (%)	2,002 (85.6)	338 (14.4)	2,340 (100.0)	595		2,935
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,494 (75.7)	480 (24.3)	1,974 (100.0)	504		2,478
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1,103 (90.6)	115 (9.4)	1,218 (100.0)	327		1,545
その他の分類不能の腎炎 (%)	924 (85.0)	163 (15.0)	1,087 (100.0)	318		1,405
多発性囊胞腎 (%)	8,047 (90.6)	834 (9.4)	8,881 (100.0)	2,375		11,256
腎硬化症 (%)	19,329 (81.4)	4,410 (18.6)	23,739 (100.0)	6,066		29,805
悪性高血圧 (%)	1,754 (85.4)	299 (14.6)	2,053 (100.0)	565		2,618
糖尿病性腎症 (%)		120,278 (100.0)	120,278 (100.0)			120,278
SLE腎炎 (%)	1,476 (82.9)	304 (17.1)	1,780 (100.0)	447		2,227
アミロイド腎 (%)	278 (78.1)	78 (21.9)	356 (100.0)	106		462
痛風腎 (%)	747 (87.6)	106 (12.4)	853 (100.0)	222		1,075
先天性代謝異常による腎不全 (%)	171 (84.2)	32 (15.8)	203 (100.0)	71		274
腎・尿路結核 (%)	131 (87.3)	19 (12.7)	150 (100.0)	45		195
腎・尿路結石 (%)	407 (87.2)	60 (12.8)	467 (100.0)	114		581
腎・尿路腫瘍 (%)	591 (83.5)	117 (16.5)	708 (100.0)	202		910
閉塞性尿路障害 (%)	519 (88.9)	65 (11.1)	584 (100.0)	146		730
骨髄腫 (%)	177 (80.5)	43 (19.5)	220 (100.0)	71		291
腎形成不全 (%)	486 (92.4)	40 (7.6)	526 (100.0)	134		660
不明 (%)	17,836 (76.7)	5,417 (23.3)	23,253 (100.0)	6,644		29,897
再導入 (%)	1,434 (82.2)	311 (17.8)	1,745 (100.0)	438		2,183
その他 (%)	4,528 (72.2)	1,742 (27.8)	6,270 (100.0)	1,774		8,044
合計 (%)	126,467 (46.6)	144,867 (53.4)	271,334 (100.0)	41,862		313,196
記載なし (%)		3 (100.0)	3 (100.0)	11	7	21
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査