

表 2713 糖尿病の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前アルブミン濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	74 (39.6)	113 (60.4)	187 (100.0)	16		203
1.5～ (%)	405 (41.0)	584 (59.0)	989 (100.0)	91		1,080
2.0～ (%)	1,725 (41.8)	2,399 (58.2)	4,124 (100.0)	428		4,552
2.5～ (%)	6,746 (44.6)	8,389 (55.4)	15,135 (100.0)	1,596		16,731
3.0～ (%)	31,394 (48.2)	33,777 (51.8)	65,171 (100.0)	7,096		72,267
3.5～ (%)	60,817 (48.8)	63,886 (51.2)	124,703 (100.0)	13,347	1	138,051
4.0～ (%)	20,117 (48.9)	21,041 (51.1)	41,158 (100.0)	4,366	1	45,525
4.5～ (%)	1,114 (54.8)	918 (45.2)	2,032 (100.0)	251		2,283
5.0～ (%)	70 (59.3)	48 (40.7)	118 (100.0)	13		131
合計 (%)	122,462 (48.3)	131,155 (51.7)	253,617 (100.0)	27,204	2	280,823
記載なし (%)	4,005 (22.6)	13,715 (77.4)	17,720 (100.0)	14,669	5	32,394
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
平均	3.58	3.56	3.57	3.57	3.75	3.57
標準偏差	0.43	0.45	0.44	0.43	0.35	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査