

表 2715 糖尿病の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別(透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	595 (49.6)	605 (50.4)	1,200 (100.0)	82		1,282
7.0～ (%)	715 (45.3)	864 (54.7)	1,579 (100.0)	130		1,709
7.5～ (%)	2,769 (44.6)	3,437 (55.4)	6,206 (100.0)	610	1	6,817
8.0～ (%)	8,290 (43.3)	10,872 (56.7)	19,162 (100.0)	1,942		21,104
8.4～ (%)	2,426 (44.4)	3,036 (55.6)	5,462 (100.0)	512		5,974
8.5～ (%)	27,439 (44.6)	34,100 (55.4)	61,539 (100.0)	6,197		67,736
9.0～ (%)	36,154 (47.6)	39,724 (52.4)	75,878 (100.0)	8,022	1	83,901
9.5～ (%)	25,540 (52.1)	23,470 (47.9)	49,010 (100.0)	5,646		54,656
10.0～ (%)	3,395 (55.3)	2,743 (44.7)	6,138 (100.0)	689		6,827
10.1～ (%)	8,422 (55.5)	6,745 (44.5)	15,167 (100.0)	1,824		16,991
10.5～ (%)	4,099 (55.1)	3,341 (44.9)	7,440 (100.0)	899		8,339
11.0～ (%)	1,397 (56.6)	1,073 (43.4)	2,470 (100.0)	313		2,783
11.5～ (%)	513 (57.3)	383 (42.7)	896 (100.0)	111		1,007
12.0～ (%)	351 (55.6)	280 (44.4)	631 (100.0)	94		725
合計 (%)	122,105 (48.3)	130,673 (51.7)	252,778 (100.0)	27,071	2	279,851
記載なし (%)	4,362 (23.5)	14,197 (76.5)	18,559 (100.0)	14,802	5	33,366
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
平均	9.23	9.13	9.18	9.23	8.45	9.18
標準偏差	0.76	0.73	0.75	0.75	0.78	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査