

表 2716 糖尿病の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

| 透析前リン濃度     | 糖尿病なし             | 糖尿病あり             | 合計                 | 不明     | 記載なし | 総計      |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|------|---------|
| 3未満<br>(%)  | 4,477<br>(45.1)   | 5,457<br>(54.9)   | 9,934<br>(100.0)   | 1,026  |      | 10,960  |
| 3.0～<br>(%) | 5,702<br>(47.0)   | 6,420<br>(53.0)   | 12,122<br>(100.0)  | 1,235  |      | 13,357  |
| 3.5～<br>(%) | 9,794<br>(46.8)   | 11,150<br>(53.2)  | 20,944<br>(100.0)  | 2,157  |      | 23,101  |
| 4.0～<br>(%) | 14,937<br>(47.7)  | 16,350<br>(52.3)  | 31,287<br>(100.0)  | 3,404  |      | 34,691  |
| 4.5～<br>(%) | 18,193<br>(48.5)  | 19,302<br>(51.5)  | 37,495<br>(100.0)  | 4,042  |      | 41,537  |
| 5.0～<br>(%) | 19,231<br>(49.3)  | 19,740<br>(50.7)  | 38,971<br>(100.0)  | 4,226  | 1    | 43,198  |
| 5.5～<br>(%) | 17,073<br>(50.4)  | 16,825<br>(49.6)  | 33,898<br>(100.0)  | 3,714  |      | 37,612  |
| 6.0～<br>(%) | 2,864<br>(49.3)   | 2,950<br>(50.7)   | 5,814<br>(100.0)   | 615    |      | 6,429   |
| 6.1～<br>(%) | 9,610<br>(48.5)   | 10,203<br>(51.5)  | 19,813<br>(100.0)  | 2,171  |      | 21,984  |
| 6.5～<br>(%) | 8,461<br>(48.6)   | 8,958<br>(51.4)   | 17,419<br>(100.0)  | 1,859  | 1    | 19,279  |
| 7.0～<br>(%) | 5,245<br>(48.2)   | 5,635<br>(51.8)   | 10,880<br>(100.0)  | 1,146  |      | 12,026  |
| 7.5～<br>(%) | 3,112<br>(46.8)   | 3,534<br>(53.2)   | 6,646<br>(100.0)   | 759    |      | 7,405   |
| 8.0～<br>(%) | 1,911<br>(47.4)   | 2,123<br>(52.6)   | 4,034<br>(100.0)   | 449    |      | 4,483   |
| 8.5～<br>(%) | 1,080<br>(44.5)   | 1,346<br>(55.5)   | 2,426<br>(100.0)   | 270    |      | 2,696   |
| 9.0～<br>(%) | 1,903<br>(48.5)   | 2,019<br>(51.5)   | 3,922<br>(100.0)   | 439    |      | 4,361   |
| 合計<br>(%)   | 123,593<br>(48.4) | 132,012<br>(51.6) | 255,605<br>(100.0) | 27,512 | 2    | 283,119 |
| 記載なし<br>(%) | 2,874<br>(18.3)   | 12,858<br>(81.7)  | 15,732<br>(100.0)  | 14,361 | 5    | 30,098  |
| 総計<br>(%)   | 126,467<br>(46.6) | 144,870<br>(53.4) | 271,337<br>(100.0) | 41,873 | 7    | 313,217 |
| 平均          | 5.26              | 5.24              | 5.25               | 5.28   | 5.90 | 5.25    |
| 標準偏差        | 1.42              | 1.46              | 1.44               | 1.45   | 0.99 | 1.44    |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査