

表 2717 糖尿病の有無 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	4,621 (49.0)	4,811 (51.0)	9,432 (100.0)	1,055	2	10,489
20～ (%)	6,604 (45.6)	7,874 (54.4)	14,478 (100.0)	1,407		15,885
40～ (%)	7,366 (46.5)	8,465 (53.5)	15,831 (100.0)	1,527		17,358
60～ (%)	8,076 (47.4)	8,948 (52.6)	17,024 (100.0)	1,706		18,730
80～ (%)	8,343 (47.2)	9,315 (52.8)	17,658 (100.0)	1,770		19,428
100～ (%)	8,221 (47.5)	9,071 (52.5)	17,292 (100.0)	1,730		19,022
120～ (%)	7,912 (47.3)	8,798 (52.7)	16,710 (100.0)	1,703		18,413
140～ (%)	7,404 (47.8)	8,092 (52.2)	15,496 (100.0)	1,585		17,081
160～ (%)	6,827 (48.4)	7,272 (51.6)	14,099 (100.0)	1,517		15,616
180～ (%)	15,697 (48.5)	16,644 (51.5)	32,341 (100.0)	3,500		35,841
240～ (%)	199 (49.0)	207 (51.0)	406 (100.0)	43		449
241～ (%)	9,551 (49.7)	9,655 (50.3)	19,206 (100.0)	2,052		21,258
300～ (%)	5,729 (51.2)	5,469 (48.8)	11,198 (100.0)	1,224		12,422
360～ (%)	3,355 (52.1)	3,084 (47.9)	6,439 (100.0)	701		7,140
420～ (%)	2,122 (55.0)	1,734 (45.0)	3,856 (100.0)	448		4,304
480～ (%)	561 (58.4)	400 (41.6)	961 (100.0)	118		1,079
500～ (%)	811 (55.2)	659 (44.8)	1,470 (100.0)	173		1,643
540～ (%)	918 (56.1)	717 (43.9)	1,635 (100.0)	184		1,819
600～ (%)	1,640 (59.2)	1,129 (40.8)	2,769 (100.0)	349		3,118
800～ (%)	1,495 (67.9)	707 (32.1)	2,202 (100.0)	305		2,507
合計 (%)	107,452 (48.7)	113,051 (51.3)	220,503 (100.0)	23,097	2	243,602
記載なし (%)	2,078 (39.9)	3,129 (60.1)	5,207 (100.0)	744		5,951
総計 (%)	109,530 (48.5)	116,180 (51.5)	225,710 (100.0)	23,841	2	249,553
平均	188.62	168.86	178.49	186.86	10.06	179.28
標準偏差	191.34	147.42	170.53	183.28	1.33	171.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往が有りの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査