

表 2718 糖尿病の有無 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前ヘモグロビン 濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)	68 (34.9)	127 (65.1)	195 (100.0)	60		255
5～ (%)	132 (34.6)	249 (65.4)	381 (100.0)	59		440
6～ (%)	452 (44.8)	557 (55.2)	1,009 (100.0)	115		1,124
7～ (%)	1,732 (46.1)	2,023 (53.9)	3,755 (100.0)	390		4,145
8～ (%)	5,902 (46.3)	6,846 (53.7)	12,748 (100.0)	1,249		13,997
9～ (%)	19,273 (47.6)	21,256 (52.4)	40,529 (100.0)	4,142		44,671
10～ (%)	41,448 (48.6)	43,785 (51.4)	85,233 (100.0)	9,010		94,243
11～ (%)	36,123 (49.4)	36,953 (50.6)	73,076 (100.0)	7,902		80,978
12～ (%)	13,404 (48.2)	14,408 (51.8)	27,812 (100.0)	2,993	1	30,806
13～ (%)	3,340 (46.7)	3,813 (53.3)	7,153 (100.0)	770	1	7,924
14～ (%)	1,205 (46.0)	1,413 (54.0)	2,618 (100.0)	313		2,931
合計 (%)	123,079 (48.4)	131,430 (51.6)	254,509 (100.0)	27,003	2	281,514
記載なし (%)	3,388 (20.1)	13,440 (79.9)	16,828 (100.0)	14,870	5	31,703
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
平均	10.77	10.74	10.75	10.76	12.85	10.75
標準偏差	1.25	1.30	1.28	1.31	0.78	1.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査