

表 2719 糖尿病の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

総コレステロール 濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	2,533 (32.4)	5,284 (67.6)	7,817 (100.0)	592		8,409
100～ (%)	8,430 (37.2)	14,226 (62.8)	22,656 (100.0)	1,930		24,586
120～ (%)	17,793 (42.8)	23,766 (57.2)	41,559 (100.0)	3,972		45,531
140～ (%)	23,411 (48.2)	25,159 (51.8)	48,570 (100.0)	5,097		53,667
160～ (%)	21,053 (52.7)	18,883 (47.3)	39,936 (100.0)	4,579		44,515
180～ (%)	14,269 (55.8)	11,297 (44.2)	25,566 (100.0)	3,184		28,750
200～ (%)	7,742 (58.3)	5,546 (41.7)	13,288 (100.0)	1,672		14,960
220～ (%)	3,645 (59.7)	2,463 (40.3)	6,108 (100.0)	762		6,870
240～ (%)	1,545 (60.6)	1,003 (39.4)	2,548 (100.0)	273		2,821
260～ (%)	961 (57.3)	715 (42.7)	1,676 (100.0)	184		1,860
合計 (%)	101,382 (48.3)	108,342 (51.7)	209,724 (100.0)	22,245		231,969
記載なし (%)	25,085 (40.7)	36,528 (59.3)	61,613 (100.0)	19,628	7	81,248
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
平均	161.10	151.11	155.94	160.24		156.35
標準偏差	35.85	35.34	35.93	35.40		35.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査