

表 2721 糖尿病の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

Non-HDL-C濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	1,239 (38.4)	1,988 (61.6)	3,227 (100.0)	322		3,549
50～ (%)	6,611 (41.4)	9,349 (58.6)	15,960 (100.0)	1,492		17,452
70～ (%)	16,311 (45.7)	19,374 (54.3)	35,685 (100.0)	3,523		39,208
90～ (%)	20,764 (48.7)	21,874 (51.3)	42,638 (100.0)	4,394		47,032
110～ (%)	17,784 (51.6)	16,681 (48.4)	34,465 (100.0)	3,747		38,212
130～ (%)	10,992 (52.3)	10,036 (47.7)	21,028 (100.0)	2,298		23,326
150～ (%)	5,474 (51.3)	5,188 (48.7)	10,662 (100.0)	1,210		11,872
170～ (%)	2,435 (52.6)	2,198 (47.4)	4,633 (100.0)	491		5,124
190～ (%)	930 (49.7)	942 (50.3)	1,872 (100.0)	174		2,046
210～ (%)	559 (47.7)	612 (52.3)	1,171 (100.0)	95		1,266
合計 (%)	83,099 (48.5)	88,242 (51.5)	171,341 (100.0)	17,746		189,087
記載なし (%)	43,368 (43.4)	56,628 (56.6)	99,996 (100.0)	24,127	7	124,130
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
平均	109.34	105.34	107.28	108.40		107.39
標準偏差	33.01	33.78	33.47	32.95		33.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査