

表 2722 糖尿病の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前収縮期血圧	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	30 (71.4)	12 (28.6)	42 (100.0)	4		46
60～ (%)	273 (68.9)	123 (31.1)	396 (100.0)	49		445
80～ (%)	2,222 (65.2)	1,184 (34.8)	3,406 (100.0)	472		3,878
100～ (%)	10,636 (60.1)	7,061 (39.9)	17,697 (100.0)	2,200		19,897
120～ (%)	29,904 (56.6)	22,940 (43.4)	52,844 (100.0)	6,298		59,142
140～ (%)	40,961 (50.6)	40,034 (49.4)	80,995 (100.0)	8,636		89,631
160～ (%)	26,186 (42.9)	34,808 (57.1)	60,994 (100.0)	5,464	2	66,460
180～ (%)	8,195 (34.0)	15,896 (66.0)	24,091 (100.0)	1,811		25,902
200～ (%)	1,609 (25.8)	4,616 (74.2)	6,225 (100.0)	371		6,596
220～ (%)	282 (21.5)	1,029 (78.5)	1,311 (100.0)	78		1,389
合計 (%)	120,298 (48.5)	127,703 (51.5)	248,001 (100.0)	25,383	2	273,386
記載なし (%)	6,169 (26.4)	17,167 (73.6)	23,336 (100.0)	16,490	5	39,831
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
平均	147.46	156.05	151.88	147.82	169.00	151.51
標準偏差	23.42	24.80	24.52	23.63	2.83	24.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査