

表 2723 糖尿病の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前拡張期血圧	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	52 (59.1)	36 (40.9)	88 (100.0)	10		98
20～ (%)	434 (54.3)	366 (45.8)	800 (100.0)	82		882
40～ (%)	9,729 (46.3)	11,285 (53.7)	21,014 (100.0)	2,127		23,141
60～ (%)	53,457 (47.2)	59,805 (52.8)	113,262 (100.0)	11,478		124,740
80～ (%)	30,111 (49.6)	30,621 (50.4)	60,732 (100.0)	6,340	2	67,074
90～ (%)	17,301 (51.4)	16,354 (48.6)	33,655 (100.0)	3,425		37,080
100～ (%)	8,379 (49.7)	8,471 (50.3)	16,850 (100.0)	1,769		18,619
120～ (%)	559 (50.1)	556 (49.9)	1,115 (100.0)	112		1,227
140～ (%)	31 (38.8)	49 (61.3)	80 (100.0)	4		84
合計 (%)	120,053 (48.5)	127,543 (51.5)	247,596 (100.0)	25,347	2	272,945
記載なし (%)	6,414 (27.0)	17,327 (73.0)	23,741 (100.0)	16,526	5	40,272
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
平均	78.37	77.58	77.97	78.17	82.00	77.99
標準偏差	14.59	14.52	14.56	14.52	1.41	14.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査