

表 2725 透析前アルブミン濃度(g/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	177 (0.1)	918 (0.4)	3,852 (1.7)	13,605 (6.1)	56,978 (25.5)	108,967 (48.7)	37,192 (16.6)	1,915 (0.9)	109 (0.0)	223,713 (100.0)	25,012	248,725	3.57	0.45
血液透析濾過 (%)	7 (0.0)	83 (0.2)	398 (0.8)	2,000 (4.0)	12,579 (25.5)	26,438 (53.5)	7,610 (15.4)	292 (0.6)	17 (0.0)	49,424 (100.0)	4,352	53,776	3.60	0.38
血液濾過 (%)		1 (7.7)	1 (7.7)	3 (23.1)	5 (38.5)	3 (23.1)				13 (100.0)	3	16	3.00	0.61
血液吸着透析 (%)		2 (0.2)	10 (0.8)	63 (4.8)	355 (27.2)	713 (54.6)	157 (12.0)	6 (0.5)		1,306 (100.0)	70	1,376	3.57	0.38
在宅血液透析 (%)				3 (0.7)	35 (8.0)	165 (37.5)	196 (44.5)	40 (9.1)	1 (0.2)	440 (100.0)	115	555	3.95	0.38
腹膜透析 (%)	19 (0.3)	76 (1.3)	291 (4.9)	1,057 (17.8)	2,315 (39.1)	1,765 (29.8)	370 (6.2)	30 (0.5)	4 (0.1)	5,927 (100.0)	2,842	8,769	3.25	0.51
合計 (%)	203 (0.1)	1,080 (0.4)	4,552 (1.6)	16,731 (6.0)	72,267 (25.7)	138,051 (49.2)	45,525 (16.2)	2,283 (0.8)	131 (0.0)	280,823 (100.0)	32,394	313,217	3.57	0.44
記載なし (%)														
総計 (%)	203 (0.1)	1,080 (0.4)	4,552 (1.6)	16,731 (6.0)	72,267 (25.7)	138,051 (49.2)	45,525 (16.2)	2,283 (0.8)	131 (0.0)	280,823 (100.0)	32,394	313,217	3.57	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査