

表 2728 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別（透析患者全体）

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	136 (0.1)	672 (0.4)	2,755 (1.5)	10,077 (5.6)	44,013 (24.4)	88,897 (49.2)	32,120 (17.8)	1,739 (1.0)	97 (0.1)	180,506 (100.0)	20,831	201,337	3.59	0.44
女性 (%)	67 (0.1)	408 (0.4)	1,797 (1.8)	6,654 (6.6)	28,254 (28.2)	49,154 (49.0)	13,405 (13.4)	544 (0.5)	34 (0.0)	100,317 (100.0)	11,563	111,880	3.53	0.44
合計 (%)	203 (0.1)	1,080 (0.4)	4,552 (1.6)	16,731 (6.0)	72,267 (25.7)	138,051 (49.2)	45,525 (16.2)	2,283 (0.8)	131 (0.0)	280,823 (100.0)	32,394	313,217	3.57	0.44
記載なし (%)														
総計 (%)	203 (0.1)	1,080 (0.4)	4,552 (1.6)	16,731 (6.0)	72,267 (25.7)	138,051 (49.2)	45,525 (16.2)	2,283 (0.8)	131 (0.0)	280,823 (100.0)	32,394	313,217	3.57	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査