

表 2745 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	108 (0.1)	521 (0.4)	2,178 (1.6)	7,827 (5.6)	33,431 (24.1)	68,281 (49.1)	25,171 (18.1)	1,375 (1.0)	78 (0.1)	138,970 (100.0)	5,470	144,440	3.59	0.44
女性 (%)	44 (0.1)	306 (0.4)	1,401 (1.8)	5,116 (6.7)	21,449 (28.1)	37,206 (48.7)	10,436 (13.7)	428 (0.6)	25 (0.0)	76,411 (100.0)	3,001	79,412	3.53	0.44
合計 (%)	152 (0.1)	827 (0.4)	3,579 (1.7)	12,943 (6.0)	54,880 (25.5)	105,487 (49.0)	35,607 (16.5)	1,803 (0.8)	103 (0.0)	215,381 (100.0)	8,471	223,852	3.57	0.44
記載なし (%)														
総計 (%)	152 (0.1)	827 (0.4)	3,579 (1.7)	12,943 (6.0)	54,880 (25.5)	105,487 (49.0)	35,607 (16.5)	1,803 (0.8)	103 (0.0)	215,381 (100.0)	8,471	223,852	3.57	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査