

表 2762 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 （％）	3 (0.0)	39 (0.1)	233 (0.8)	1,108 (3.6)	7,471 (24.2)	16,506 (53.6)	5,233 (17.0)	209 (0.7)	12 (0.0)	30,814 (100.0)	816	31,630	3.62	0.38
女性 （％）	4 (0.0)	32 (0.2)	148 (0.8)	836 (4.8)	4,860 (27.8)	9,377 (53.7)	2,141 (12.3)	70 (0.4)	5 (0.0)	17,473 (100.0)	478	17,951	3.56	0.38
合計 （％）	7 (0.0)	71 (0.1)	381 (0.8)	1,944 (4.0)	12,331 (25.5)	25,883 (53.6)	7,374 (15.3)	279 (0.6)	17 (0.0)	48,287 (100.0)	1,294	49,581	3.60	0.38
記載なし （％）														
総計 （％）	7 (0.0)	71 (0.1)	381 (0.8)	1,944 (4.0)	12,331 (25.5)	25,883 (53.6)	7,374 (15.3)	279 (0.6)	17 (0.0)	48,287 (100.0)	1,294	49,581	3.60	0.38

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査