

表 2764 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析歴(年)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	3 (0.0)	23 (0.4)	76 (1.2)	317 (5.1)	1,511 (24.3)	3,179 (51.1)	1,038 (16.7)	68 (1.1)	1 (0.0)	6,216 (100.0)	189	6,405	3.60	0.42
2年～ (%)	2 (0.0)	9 (0.1)	79 (0.7)	425 (3.9)	2,669 (24.7)	5,737 (53.0)	1,821 (16.8)	71 (0.7)	4 (0.0)	10,817 (100.0)	252	11,069	3.62	0.38
5年～ (%)	1 (0.0)	23 (0.2)	108 (0.9)	500 (4.0)	3,160 (25.5)	6,700 (54.0)	1,855 (15.0)	54 (0.4)	5 (0.0)	12,406 (100.0)	368	12,774	3.60	0.38
10年～ (%)		8 (0.1)	47 (0.6)	272 (3.7)	1,892 (25.6)	4,005 (54.2)	1,121 (15.2)	37 (0.5)	1 (0.0)	7,383 (100.0)	180	7,563	3.61	0.37
15年～ (%)		5 (0.1)	26 (0.6)	147 (3.2)	1,137 (24.8)	2,592 (56.5)	650 (14.2)	26 (0.6)	1 (0.0)	4,584 (100.0)	112	4,696	3.61	0.36
20年～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	12 (0.4)	101 (3.4)	787 (26.4)	1,629 (54.6)	436 (14.6)	11 (0.4)	3 (0.1)	2,981 (100.0)	77	3,058	3.60	0.36
25年～ (%)		1 (0.1)	4 (0.2)	70 (3.7)	501 (26.6)	1,036 (55.1)	258 (13.7)	10 (0.5)	1 (0.1)	1,881 (100.0)	49	1,930	3.60	0.35
30年～ (%)			13 (1.1)	53 (4.6)	352 (30.5)	606 (52.6)	128 (11.1)	1 (0.1)		1,153 (100.0)	44	1,197	3.54	0.36
35年～ (%)		1 (0.2)	9 (1.4)	40 (6.4)	230 (36.7)	303 (48.3)	42 (6.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	627 (100.0)	11	638	3.48	0.39
40年～ (%)			7 (3.6)	18 (9.2)	84 (43.1)	73 (37.4)	13 (6.7)			195 (100.0)	2	197	3.37	0.41
合計 (%)	7 (0.0)	71 (0.1)	381 (0.8)	1,943 (4.0)	12,323 (25.5)	25,860 (53.6)	7,362 (15.3)	279 (0.6)	17 (0.0)	48,243 (100.0)	1,284	49,527	3.60	0.38
不明 (%)				1 (2.3)	8 (18.2)	23 (52.3)	12 (27.3)			44 (100.0)	10	54	3.71	0.33
記載なし (%)														
総計 (%)	7 (0.0)	71 (0.1)	381 (0.8)	1,944 (4.0)	12,331 (25.5)	25,883 (53.6)	7,374 (15.3)	279 (0.6)	17 (0.0)	48,287 (100.0)	1,294	49,581	3.60	0.38
平均	4.86	6.55	8.94	9.54	10.18	9.74	8.85	7.46	11.94	9.69	9.53	9.68		
標準偏差	7.38	7.17	9.76	9.40	9.20	8.58	8.01	7.40	10.26	8.71	8.72	8.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査