

表 2765 透析前アルブミン濃度(g/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	2 (0.0)	15 (0.1)	103 (0.6)	636 (3.7)	4,198 (24.7)	9,238 (54.3)	2,705 (15.9)	110 (0.6)	6 (0.0)	17,013 (100.0)	449	17,462	3.62	0.37
慢性腎盂腎炎 （％）			3 (0.6)	21 (4.4)	123 (25.8)	245 (51.5)	81 (17.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	476 (100.0)	8	484	3.60	0.38
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		1 (0.3)	9 (2.6)	27 (7.7)	106 (30.4)	168 (48.1)	35 (10.0)	3 (0.9)		349 (100.0)	4	353	3.48	0.44
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）			3 (0.8)	10 (2.6)	94 (24.5)	236 (61.5)	40 (10.4)	1 (0.3)		384 (100.0)	17	401	3.59	0.33
その他の分類不 能の腎炎 （％）		1 (0.4)	1 (0.4)	8 (3.1)	58 (22.6)	131 (51.0)	54 (21.0)	4 (1.6)		257 (100.0)	4	261	3.67	0.40
多発性嚢胞腎 （％）		4 (0.2)	9 (0.5)	82 (4.5)	522 (28.4)	1,000 (54.3)	218 (11.8)	5 (0.3)		1,840 (100.0)	40	1,880	3.56	0.36
腎硬化症 （％）		5 (0.1)	28 (0.8)	156 (4.2)	1,117 (30.0)	1,934 (51.9)	461 (12.4)	28 (0.8)		3,729 (100.0)	91	3,820	3.57	0.37
悪性高血圧 （％）			1 (0.3)	11 (2.9)	82 (21.6)	206 (54.4)	75 (19.8)	2 (0.5)	2 (0.5)	379 (100.0)	12	391	3.66	0.38
糖尿病性腎症 （％）	3 (0.0)	30 (0.2)	151 (0.9)	684 (4.1)	4,150 (25.1)	8,831 (53.4)	2,614 (15.8)	69 (0.4)	7 (0.0)	16,539 (100.0)	421	16,960	3.60	0.39
SLE腎炎 （％）			2 (0.5)	24 (5.8)	134 (32.6)	198 (48.2)	50 (12.2)	2 (0.5)	1 (0.2)	411 (100.0)	15	426	3.55	0.38
アミロイド腎 （％）		1 (1.4)	7 (9.7)	10 (13.9)	15 (20.8)	33 (45.8)	6 (8.3)			72 (100.0)	2	74	3.35	0.56
痛風腎 （％）			1 (0.6)	6 (3.8)	46 (28.8)	85 (53.1)	22 (13.8)			160 (100.0)	6	166	3.57	0.35
先天性代謝異常 による腎不全 （％）				2 (4.2)	5 (10.4)	22 (45.8)	17 (35.4)	2 (4.2)		48 (100.0)	1	49	3.83	0.39
腎・尿路結核 （％）				4 (13.3)	8 (26.7)	11 (36.7)	7 (23.3)			30 (100.0)	1	31	3.50	0.42
腎・尿路結石 （％）			1 (1.3)	4 (5.3)	20 (26.3)	43 (56.6)	8 (10.5)			76 (100.0)	3	79	3.55	0.40
腎・尿路腫瘍 （％）		1 (0.9)		2 (1.7)	40 (34.2)	59 (50.4)	15 (12.8)			117 (100.0)	2	119	3.58	0.37
閉塞性尿路障害 （％）				6 (5.8)	23 (22.1)	56 (53.8)	15 (14.4)	4 (3.8)		104 (100.0)		104	3.64	0.40
骨髄腫 （％）			1 (3.2)	1 (3.2)	14 (45.2)	12 (38.7)	3 (9.7)			31 (100.0)	2	33	3.46	0.44
腎形成不全 （％）				3 (2.3)	24 (18.0)	58 (43.6)	44 (33.1)	4 (3.0)		133 (100.0)	3	136	3.79	0.40
不明 （％）	2 (0.0)	10 (0.2)	39 (0.9)	181 (4.0)	1,159 (25.6)	2,463 (54.5)	635 (14.0)	33 (0.7)		4,522 (100.0)	181	4,703	3.59	0.39
再導入 （％）		1 (0.2)	1 (0.2)	16 (3.4)	115 (24.4)	254 (53.8)	84 (17.8)	1 (0.2)		472 (100.0)	11	483	3.63	0.36
その他 （％）		2 (0.2)	21 (1.8)	50 (4.4)	275 (24.1)	597 (52.4)	185 (16.2)	9 (0.8)		1,139 (100.0)	21	1,160	3.60	0.41
合計 （％）	7 (0.0)	71 (0.1)	381 (0.8)	1,944 (4.0)	12,328 (25.5)	25,880 (53.6)	7,374 (15.3)	279 (0.6)	17 (0.0)	48,281 (100.0)	1,294	49,575	3.60	0.38
記載なし （％）					3 (50.0)	3 (50.0)				6 (100.0)		6	3.45	0.29
総計 （％）	7 (0.0)	71 (0.1)	381 (0.8)	1,944 (4.0)	12,331 (25.5)	25,883 (53.6)	7,374 (15.3)	279 (0.6)	17 (0.0)	48,287 (100.0)	1,294	49,581	3.60	0.38

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査