

表 2779 アルブミン濃度(g/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	10 (0.3)	42 (1.1)	174 (4.5)	677 (17.7)	1,512 (39.4)	1,135 (29.6)	263 (6.9)	18 (0.5)	2 (0.1)	3,833 (100.0)	1,841	5,674	3.26	0.51
女性 (%)	9 (0.4)	34 (1.6)	117 (5.6)	380 (18.1)	803 (38.3)	630 (30.1)	107 (5.1)	12 (0.6)	2 (0.1)	2,094 (100.0)	1,001	3,095	3.24	0.53
合計 (%)	19 (0.3)	76 (1.3)	291 (4.9)	1,057 (17.8)	2,315 (39.1)	1,765 (29.8)	370 (6.2)	30 (0.5)	4 (0.1)	5,927 (100.0)	2,842	8,769	3.25	0.51
記載なし (%)														
総計 (%)	19 (0.3)	76 (1.3)	291 (4.9)	1,057 (17.8)	2,315 (39.1)	1,765 (29.8)	370 (6.2)	30 (0.5)	4 (0.1)	5,927 (100.0)	2,842	8,769	3.25	0.51

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査