

表 2782 アルブミン濃度(g/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	4 (0.2)	19 (1.0)	60 (3.1)	285 (14.8)	769 (39.8)	649 (33.6)	133 (6.9)	10 (0.5)	2 (0.1)	1,931 (100.0)	899	2,830	3.32	0.48
慢性腎盂腎炎 （％）		2 (2.8)	5 (6.9)	19 (26.4)	16 (22.2)	21 (29.2)	8 (11.1)	1 (1.4)		72 (100.0)	25	97	3.26	0.60
急速進行性糸球 体腎炎 （％）	1 (2.3)	6 (13.6)	8 (18.2)	12 (27.3)	11 (25.0)	6 (13.6)				44 (100.0)	22	66	3.22	0.66
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）				1 (4.2)	10 (41.7)	9 (37.5)	3 (12.5)	1 (4.2)		24 (100.0)	3	27	3.55	0.48
その他の分類不 能の腎炎 （％）	1 (1.9)		3 (5.8)	6 (11.5)	13 (25.0)	21 (40.4)	7 (13.5)	1 (1.9)		52 (100.0)	26	78	3.41	0.59
多発性嚢胞腎 （％）		1 (0.6)	3 (1.8)	22 (13.2)	67 (40.1)	60 (35.9)	12 (7.2)	2 (1.2)		167 (100.0)	96	263	3.34	0.46
腎硬化症 （％）	2 (0.3)	4 (0.5)	47 (6.4)	152 (20.7)	293 (39.8)	204 (27.7)	31 (4.2)	3 (0.4)		736 (100.0)	359	1,095	3.20	0.49
悪性高血圧 （％）			3 (4.1)	9 (12.3)	23 (31.5)	28 (38.4)	10 (13.7)			73 (100.0)	34	107	3.44	0.46
糖尿病性腎症 （％）	6 (0.3)	29 (1.5)	116 (6.2)	383 (20.4)	754 (40.3)	478 (25.5)	98 (5.2)	7 (0.4)	2 (0.1)	1,873 (100.0)	926	2,799	3.19	0.52
SLE腎炎 （％）				6 (19.4)	15 (48.4)	8 (25.8)	2 (6.5)			31 (100.0)	15	46	3.30	0.42
アミロイド腎 （％）		1 (9.1)		5 (45.5)	3 (27.3)	2 (18.2)				11 (100.0)	4	15	2.94	0.62
痛風腎 （％）				5 (19.2)	9 (34.6)	8 (30.8)	4 (15.4)			26 (100.0)	6	32	3.37	0.44
先天性代謝異常 による腎不全 （％）		1 (8.3)		1 (8.3)	5 (41.7)	3 (25.0)	2 (16.7)			12 (100.0)	5	17	3.33	0.63
腎・尿路結核 （％）						1 (100.0)				1 (100.0)	1	2	3.60	
腎・尿路結石 （％）			1 (5.9)	4 (23.5)	10 (58.8)	2 (11.8)				17 (100.0)	4	21	3.10	0.37
腎・尿路腫瘍 （％）		1 (8.3)		4 (33.3)	3 (25.0)	4 (33.3)				12 (100.0)	2	14	3.11	0.64
閉塞性尿路障害 （％）			1 (6.3)	1 (6.3)	8 (50.0)	6 (37.5)				16 (100.0)	5	21	3.32	0.41
骨髄腫 （％）				1 (25.0)	3 (75.0)					4 (100.0)	3	7	3.05	0.13
腎形成不全 （％）			3 (6.1)	6 (12.2)	8 (16.3)	23 (46.9)	8 (16.3)	1 (2.0)		49 (100.0)	23	72	3.52	0.57
不明 （％）	4 (0.7)	9 (1.6)	37 (6.6)	97 (17.2)	220 (39.0)	160 (28.4)	33 (5.9)	4 (0.7)		564 (100.0)	278	842	3.23	0.54
再導入 （％）				9 (25.7)	15 (42.9)	9 (25.7)	2 (5.7)			35 (100.0)	20	55	3.28	0.41
その他 （％）	2 (1.1)	8 (4.5)	6 (3.4)	33 (18.6)	59 (33.3)	58 (32.8)	11 (6.2)			177 (100.0)	86	263	3.23	0.60
合計 （％）	19 (0.3)	76 (1.3)	291 (4.9)	1,057 (17.8)	2,315 (39.1)	1,765 (29.8)	370 (6.2)	30 (0.5)	4 (0.1)	5,927 (100.0)	2,842	8,769	3.25	0.51
記載なし （％）														
総計 （％）	19 (0.3)	76 (1.3)	291 (4.9)	1,057 (17.8)	2,315 (39.1)	1,765 (29.8)	370 (6.2)	30 (0.5)	4 (0.1)	5,927 (100.0)	2,842	8,769	3.25	0.51

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査