

表 2796 透析前CRP濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	105,606 (56.3)	37,116 (19.8)	19,008 (10.1)	12,447 (6.6)	7,434 (4.0)	2,733 (1.5)	1,332 (0.7)	678 (0.4)	795 (0.4)	513 (0.3)	187,662 (100.0)	61,063	248,725	0.64	1.86
血液透析濾過 （％）	25,448 (58.8)	8,412 (19.5)	4,213 (9.7)	2,627 (6.1)	1,422 (3.3)	527 (1.2)	244 (0.6)	135 (0.3)	128 (0.3)	88 (0.2)	43,244 (100.0)	10,532	53,776	0.55	1.62
血液濾過 （％）	4 (36.4)	3 (27.3)	2 (18.2)			1 (9.1)		1 (9.1)			11 (100.0)	5	16	1.45	2.61
血液吸着透析 （％）	597 (52.6)	265 (23.3)	124 (10.9)	74 (6.5)	49 (4.3)	12 (1.1)	3 (0.3)	1 (0.1)	6 (0.5)	5 (0.4)	1,136 (100.0)	240	1,376	0.63	1.82
在宅血液透析 （％）	236 (62.1)	76 (20.0)	32 (8.4)	23 (6.1)	9 (2.4)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)		1 (0.3)	380 (100.0)	175	555	0.55	3.24
腹膜透析 （％）	2,956 (56.3)	1,041 (19.8)	540 (10.3)	331 (6.3)	224 (4.3)	79 (1.5)	32 (0.6)	15 (0.3)	20 (0.4)	10 (0.2)	5,248 (100.0)	3,521	8,769	0.61	1.57
合計 （％）	134,847 (56.7)	46,913 (19.7)	23,919 (10.1)	15,502 (6.5)	9,138 (3.8)	3,353 (1.4)	1,612 (0.7)	831 (0.3)	949 (0.4)	617 (0.3)	237,681 (100.0)	75,536	313,217	0.62	1.81
記載なし （％）															
総計 （％）	134,847 (56.7)	46,913 (19.7)	23,919 (10.1)	15,502 (6.5)	9,138 (3.8)	3,353 (1.4)	1,612 (0.7)	831 (0.3)	949 (0.4)	617 (0.3)	237,681 (100.0)	75,536	313,217	0.62	1.81

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査