

表 2799 透析前CRP濃度(mg/dL) 性別（透析患者全体）

性別	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	82,570	32,044	16,477	10,494	6,190	2,326	1,081	568	623	407	152,780	48,557	201,337	0.66	1.85
(%)	(54.0)	(21.0)	(10.8)	(6.9)	(4.1)	(1.5)	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				
女性	52,277	14,869	7,442	5,008	2,948	1,027	531	263	326	210	84,901	26,979	111,880	0.57	1.74
(%)	(61.6)	(17.5)	(8.8)	(5.9)	(3.5)	(1.2)	(0.6)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(100.0)				
合計	134,847	46,913	23,919	15,502	9,138	3,353	1,612	831	949	617	237,681	75,536	313,217	0.62	1.81
(%)	(56.7)	(19.7)	(10.1)	(6.5)	(3.8)	(1.4)	(0.7)	(0.3)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	134,847	46,913	23,919	15,502	9,138	3,353	1,612	831	949	617	237,681	75,536	313,217	0.62	1.81
(%)	(56.7)	(19.7)	(10.1)	(6.5)	(3.8)	(1.4)	(0.7)	(0.3)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査