

表 2815 透析前CRP濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	62,632	24,555	12,655	8,113	4,852	1,812	839	442	493	321	116,714	27,726	144,440	0.67	1.89
(%)	(53.7)	(21.0)	(10.8)	(7.0)	(4.2)	(1.6)	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				
女性	39,308	11,323	5,678	3,850	2,271	795	427	196	257	161	64,266	15,146	79,412	0.58	1.74
(%)	(61.2)	(17.6)	(8.8)	(6.0)	(3.5)	(1.2)	(0.7)	(0.3)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				
合計	101,940	35,878	18,333	11,963	7,123	2,607	1,266	638	750	482	180,980	42,872	223,852	0.63	1.84
(%)	(56.3)	(19.8)	(10.1)	(6.6)	(3.9)	(1.4)	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	101,940	35,878	18,333	11,963	7,123	2,607	1,266	638	750	482	180,980	42,872	223,852	0.63	1.84
(%)	(56.3)	(19.8)	(10.1)	(6.6)	(3.9)	(1.4)	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査