

表 2831 透析前CRP濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	15,220	5,624	2,827	1,739	924	360	166	82	76	56	27,074	4,556	31,630	0.58	1.63
(%)	(56.2)	(20.8)	(10.4)	(6.4)	(3.4)	(1.3)	(0.6)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
女性	9,708	2,627	1,303	825	466	150	73	47	44	29	15,272	2,679	17,951	0.50	1.56
(%)	(63.6)	(17.2)	(8.5)	(5.4)	(3.1)	(1.0)	(0.5)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
合計	24,928	8,251	4,130	2,564	1,390	510	239	129	120	85	42,346	7,235	49,581	0.55	1.60
(%)	(58.9)	(19.5)	(9.8)	(6.1)	(3.3)	(1.2)	(0.6)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	24,928	8,251	4,130	2,564	1,390	510	239	129	120	85	42,346	7,235	49,581	0.55	1.60
(%)	(58.9)	(19.5)	(9.8)	(6.1)	(3.3)	(1.2)	(0.6)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査