

表 2847 CRP濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1,801	711	395	236	152	56	20	11	14	7	3,403	2,271	5,674	0.65	1.61
(%)	(52.9)	(20.9)	(11.6)	(6.9)	(4.5)	(1.6)	(0.6)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(100.0)				
女性	1,155	330	145	95	72	23	12	4	6	3	1,845	1,250	3,095	0.53	1.48
(%)	(62.6)	(17.9)	(7.9)	(5.1)	(3.9)	(1.2)	(0.7)	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
合計	2,956	1,041	540	331	224	79	32	15	20	10	5,248	3,521	8,769	0.61	1.57
(%)	(56.3)	(19.8)	(10.3)	(6.3)	(4.3)	(1.5)	(0.6)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	2,956	1,041	540	331	224	79	32	15	20	10	5,248	3,521	8,769	0.61	1.57
(%)	(56.3)	(19.8)	(10.3)	(6.3)	(4.3)	(1.5)	(0.6)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査