

表 2863 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	1,060 (0.5)	1,367 (0.6)	5,468 (2.5)	17,003 (7.6)	4,883 (2.2)	54,473 (24.4)	66,996 (30.1)	42,861 (19.2)	5,404 (2.4)	13,274 (6.0)	6,530 (2.9)	2,202 (1.0)	799 (0.4)	583 (0.3)	222,903 (100.0)	25,822	248,725	9.18	0.75
血液透析濾過 （％）	187 (0.4)	284 (0.6)	1,179 (2.4)	3,666 (7.4)	976 (2.0)	11,841 (24.0)	14,803 (30.0)	9,932 (20.1)	1,171 (2.4)	3,055 (6.2)	1,453 (2.9)	467 (0.9)	164 (0.3)	121 (0.2)	49,299 (100.0)	4,477	53,776	9.19	0.74
血液濾過 （％）	1 (7.7)					7 (53.8)	3 (23.1)	1 (7.7)	1 (7.7)						13 (100.0)	3	16	8.78	1.02
血液吸着透析 （％）	3 (0.2)	13 (1.0)	33 (2.5)	99 (7.6)	20 (1.5)	272 (20.8)	365 (28.0)	303 (23.2)	31 (2.4)	99 (7.6)	50 (3.8)	14 (1.1)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,305 (100.0)	71	1,376	9.24	0.73
在宅血液透析 （％）	7 (1.6)	5 (1.1)	14 (3.2)	31 (7.1)	12 (2.7)	103 (23.5)	122 (27.9)	83 (18.9)	14 (3.2)	25 (5.7)	17 (3.9)	4 (0.9)		1 (0.2)	438 (100.0)	117	555	9.13	0.87
腹膜透析 （％）	24 (0.4)	40 (0.7)	123 (2.1)	305 (5.2)	83 (1.4)	1,040 (17.6)	1,612 (27.4)	1,476 (25.0)	206 (3.5)	538 (9.1)	289 (4.9)	96 (1.6)	42 (0.7)	19 (0.3)	5,893 (100.0)	2,876	8,769	9.37	0.80
合計 （％）	1,282 (0.5)	1,709 (0.6)	6,817 (2.4)	21,104 (7.5)	5,974 (2.1)	67,736 (24.2)	83,901 (30.0)	54,656 (19.5)	6,827 (2.4)	16,991 (6.1)	8,339 (3.0)	2,783 (1.0)	1,007 (0.4)	725 (0.3)	279,851 (100.0)	33,366	313,217	9.18	0.75
記載なし （％）																			
総計 （％）	1,282 (0.5)	1,709 (0.6)	6,817 (2.4)	21,104 (7.5)	5,974 (2.1)	67,736 (24.2)	83,901 (30.0)	54,656 (19.5)	6,827 (2.4)	16,991 (6.1)	8,339 (3.0)	2,783 (1.0)	1,007 (0.4)	725 (0.3)	279,851 (100.0)	33,366	313,217	9.18	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査