

表 2882 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)						3 (30.0)	2 (20.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	1 (10.0)					10 (100.0)		10	9.43	0.56
15歳～ (%)	6 (1.1)	10 (1.8)	22 (4.1)	42 (7.8)	16 (3.0)	130 (24.0)	161 (29.8)	107 (19.8)	14 (2.6)	20 (3.7)	10 (1.8)	2 (0.4)	1 (0.2)		541 (100.0)	36	577	9.05	0.78
30歳～ (%)	76 (0.9)	99 (1.1)	298 (3.5)	703 (8.1)	203 (2.4)	2,107 (24.4)	2,563 (29.7)	1,657 (19.2)	197 (2.3)	433 (5.0)	193 (2.2)	62 (0.7)	21 (0.2)	15 (0.2)	8,627 (100.0)	377	9,004	9.10	0.77
45歳～ (%)	237 (0.7)	292 (0.8)	1,062 (2.9)	2,923 (8.1)	877 (2.4)	8,484 (23.5)	10,709 (29.7)	6,960 (19.3)	893 (2.5)	2,191 (6.1)	967 (2.7)	273 (0.8)	101 (0.3)	70 (0.2)	36,039 (100.0)	1,531	37,570	9.15	0.76
60歳～ (%)	411 (0.4)	576 (0.6)	2,401 (2.5)	7,485 (7.7)	2,104 (2.2)	23,496 (24.2)	28,745 (29.7)	18,803 (19.4)	2,380 (2.5)	5,958 (6.1)	2,983 (3.1)	1,015 (1.0)	316 (0.3)	250 (0.3)	96,923 (100.0)	4,019	100,942	9.18	0.75
75歳～ (%)	255 (0.4)	305 (0.4)	1,390 (2.0)	4,915 (7.2)	1,390 (2.0)	17,121 (25.0)	21,114 (30.8)	13,060 (19.1)	1,643 (2.4)	4,011 (5.9)	2,055 (3.0)	730 (1.1)	308 (0.4)	199 (0.3)	68,496 (100.0)	3,069	71,565	9.20	0.74
90歳～ (%)	13 (0.3)	15 (0.4)	66 (1.7)	254 (6.4)	83 (2.1)	945 (23.6)	1,227 (30.7)	816 (20.4)	109 (2.7)	260 (6.5)	123 (3.1)	48 (1.2)	17 (0.4)	22 (0.6)	3,998 (100.0)	182	4,180	9.25	0.76
合計 (%)	998 (0.5)	1,297 (0.6)	5,239 (2.4)	16,322 (7.6)	4,673 (2.2)	52,286 (24.4)	64,521 (30.1)	41,406 (19.3)	5,237 (2.4)	12,874 (6.0)	6,331 (2.9)	2,130 (1.0)	764 (0.4)	556 (0.3)	214,634 (100.0)	9,214	223,848	9.18	0.75
不明 (%)						1 (50.0)			1 (50.0)						2 (100.0)	1	3	9.45	0.78
記載なし (%)																1	1		
総計 (%)	998 (0.5)	1,297 (0.6)	5,239 (2.4)	16,322 (7.6)	4,673 (2.2)	52,287 (24.4)	64,521 (30.1)	41,406 (19.3)	5,238 (2.4)	12,874 (6.0)	6,331 (2.9)	2,130 (1.0)	764 (0.4)	556 (0.3)	214,636 (100.0)	9,216	223,852	9.18	0.75
平均	65.07	64.74	66.40	67.86	67.69	68.62	68.69	68.46	68.45	68.61	69.18	69.95	70.73	71.01	68.48	68.77	68.49		
標準偏差	13.68	13.37	12.71	12.24	12.49	12.28	12.30	12.29	12.26	11.93	11.69	11.48	11.53	11.84	12.28	12.51	12.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査