

表 2897 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			1 (100.0)												1 (100.0)		1	7.70	
15歳～ (%)	3 (1.6)	1 (0.5)	7 (3.7)	12 (6.3)	1 (0.5)	53 (27.9)	66 (34.7)	30 (15.8)	2 (1.1)	6 (3.2)	7 (3.7)	2 (1.1)			190 (100.0)	10	200	9.08	0.73
30歳～ (%)	16 (0.6)	27 (1.0)	90 (3.2)	247 (8.7)	70 (2.5)	705 (24.9)	821 (29.0)	552 (19.5)	62 (2.2)	145 (5.1)	62 (2.2)	18 (0.6)	7 (0.2)	5 (0.2)	2,827 (100.0)	90	2,917	9.10	0.73
45歳～ (%)	53 (0.5)	85 (0.8)	296 (2.7)	869 (8.0)	218 (2.0)	2,605 (23.9)	3,253 (29.8)	2,170 (19.9)	237 (2.2)	654 (6.0)	308 (2.8)	96 (0.9)	34 (0.3)	20 (0.2)	10,898 (100.0)	308	11,206	9.17	0.74
60歳～ (%)	75 (0.3)	120 (0.5)	546 (2.4)	1,650 (7.3)	444 (2.0)	5,343 (23.7)	6,683 (29.7)	4,603 (20.4)	571 (2.5)	1,451 (6.4)	702 (3.1)	206 (0.9)	77 (0.3)	55 (0.2)	22,526 (100.0)	631	23,157	9.20	0.74
75歳～ (%)	34 (0.3)	44 (0.4)	210 (1.9)	761 (6.8)	211 (1.9)	2,707 (24.2)	3,471 (31.1)	2,264 (20.3)	255 (2.3)	685 (6.1)	333 (3.0)	125 (1.1)	41 (0.4)	32 (0.3)	11,173 (100.0)	354	11,527	9.22	0.72
90歳～ (%)		1 (0.2)	5 (0.9)	32 (5.8)	9 (1.6)	139 (25.3)	173 (31.5)	116 (21.1)	15 (2.7)	36 (6.5)	13 (2.4)	9 (1.6)		2 (0.4)	550 (100.0)	23	573	9.27	0.68
合計 (%)	181 (0.4)	278 (0.6)	1,155 (2.4)	3,571 (7.4)	953 (2.0)	11,552 (24.0)	14,467 (30.0)	9,735 (20.2)	1,142 (2.4)	2,977 (6.2)	1,425 (3.0)	456 (0.9)	159 (0.3)	114 (0.2)	48,165 (100.0)	1,416	49,581	9.19	0.74
不明 (%)																			
記載なし (%)																			
総計 (%)	181 (0.4)	278 (0.6)	1,155 (2.4)	3,571 (7.4)	953 (2.0)	11,552 (24.0)	14,467 (30.0)	9,735 (20.2)	1,142 (2.4)	2,977 (6.2)	1,425 (3.0)	456 (0.9)	159 (0.3)	114 (0.2)	48,165 (100.0)	1,416	49,581	9.19	0.74
平均	62.35	62.34	63.17	64.48	65.06	65.44	65.66	65.61	65.94	65.82	66.06	66.79	66.16	67.87	65.45	65.71	65.46		
標準偏差	13.24	13.15	12.74	12.46	12.57	12.58	12.57	12.33	11.93	11.95	12.00	12.61	11.51	11.46	12.46	13.29	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査