

表 2911 補正カルシウム濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	19	31	95	223	60	737	1,086	911	105	316	151	43	21	12	3,810	1,864	5,674	9.29	0.78
(%)	(0.5)	(0.8)	(2.5)	(5.9)	(1.6)	(19.3)	(28.5)	(23.9)	(2.8)	(8.3)	(4.0)	(1.1)	(0.6)	(0.3)	(100.0)				
女性	5	9	28	82	23	303	526	565	101	222	138	53	21	7	2,083	1,012	3,095	9.52	0.80
(%)	(0.2)	(0.4)	(1.3)	(3.9)	(1.1)	(14.5)	(25.3)	(27.1)	(4.8)	(10.7)	(6.6)	(2.5)	(1.0)	(0.3)	(100.0)				
合計	24	40	123	305	83	1,040	1,612	1,476	206	538	289	96	42	19	5,893	2,876	8,769	9.37	0.80
(%)	(0.4)	(0.7)	(2.1)	(5.2)	(1.4)	(17.6)	(27.4)	(25.0)	(3.5)	(9.1)	(4.9)	(1.6)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	24	40	123	305	83	1,040	1,612	1,476	206	538	289	96	42	19	5,893	2,876	8,769	9.37	0.80
(%)	(0.4)	(0.7)	(2.1)	(5.2)	(1.4)	(17.6)	(27.4)	(25.0)	(3.5)	(9.1)	(4.9)	(1.6)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査