

表 2912 補正カルシウム濃度(mg/dL) 年齢(歳)別（腹膜透析患者）

年齢	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			1 (1.7)		1 (1.7)	4 (6.8)	3 (5.1)	10 (16.9)	3 (5.1)	11 (18.6)	10 (16.9)	10 (16.9)	4 (6.8)	2 (3.4)	59 (100.0)	30	89	10.35	1.02
15歳～ (%)	1 (1.5)			4 (6.1)	1 (1.5)	11 (16.7)	13 (19.7)	13 (19.7)	2 (3.0)	11 (16.7)	3 (4.5)	2 (3.0)	3 (4.5)	2 (3.0)	66 (100.0)	35	101	9.66	1.08
30歳～ (%)	2 (0.5)	8 (1.9)	14 (3.3)	32 (7.7)	5 (1.2)	77 (18.4)	131 (31.3)	96 (23.0)	10 (2.4)	31 (7.4)	6 (1.4)	5 (1.2)	1 (0.2)		418 (100.0)	242	660	9.18	0.77
45歳～ (%)	10 (0.6)	7 (0.4)	38 (2.4)	97 (6.1)	24 (1.5)	281 (17.8)	452 (28.6)	393 (24.9)	51 (3.2)	138 (8.7)	68 (4.3)	13 (0.8)	6 (0.4)	1 (0.1)	1,579 (100.0)	741	2,320	9.30	0.76
60歳～ (%)	8 (0.3)	20 (0.8)	59 (2.3)	110 (4.2)	39 (1.5)	479 (18.4)	692 (26.6)	648 (24.9)	97 (3.7)	238 (9.2)	144 (5.5)	41 (1.6)	15 (0.6)	8 (0.3)	2,598 (100.0)	1,225	3,823	9.38	0.79
75歳～ (%)	3 (0.3)	5 (0.5)	11 (1.0)	58 (5.3)	13 (1.2)	175 (16.1)	295 (27.1)	294 (27.0)	41 (3.8)	96 (8.8)	57 (5.2)	22 (2.0)	13 (1.2)	6 (0.6)	1,089 (100.0)	560	1,649	9.45	0.79
90歳～ (%)				4 (4.8)		13 (15.5)	26 (31.0)	22 (26.2)	2 (2.4)	13 (15.5)	1 (1.2)	3 (3.6)			84 (100.0)	43	127	9.47	0.69
合計 (%)	24 (0.4)	40 (0.7)	123 (2.1)	305 (5.2)	83 (1.4)	1,040 (17.6)	1,612 (27.4)	1,476 (25.0)	206 (3.5)	538 (9.1)	289 (4.9)	96 (1.6)	42 (0.7)	19 (0.3)	5,893 (100.0)	2,876	8,769	9.37	0.80
不明 (%)																			
記載なし (%)																			
総計 (%)	24 (0.4)	40 (0.7)	123 (2.1)	305 (5.2)	83 (1.4)	1,040 (17.6)	1,612 (27.4)	1,476 (25.0)	206 (3.5)	538 (9.1)	289 (4.9)	96 (1.6)	42 (0.7)	19 (0.3)	5,893 (100.0)	2,876	8,769	9.37	0.80
平均	56.63	61.50	59.76	61.72	61.78	62.63	63.12	63.62	63.62	62.74	62.83	60.04	60.21	59.79	62.85	62.70	62.80		
標準偏差	14.83	14.08	12.15	14.02	12.97	13.33	13.57	14.06	14.50	15.96	16.01	23.45	24.39	27.45	14.42	14.89	14.58		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査