

表 2929 透析前リン濃度(mg/dL) 性別（透析患者全体）

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	6,633 (3.6)	8,691 (4.8)	14,634 (8.0)	22,022 (12.1)	26,378 (14.5)	27,558 (15.1)	24,109 (13.2)	4,084 (2.2)	14,323 (7.9)	12,610 (6.9)	8,052 (4.4)	4,989 (2.7)	3,070 (1.7)	1,839 (1.0)	3,018 (1.7)	182,010 (100.0)	19,327	201,337	5.28	1.45
女性 (%)	4,327 (4.3)	4,666 (4.6)	8,467 (8.4)	12,669 (12.5)	15,159 (15.0)	15,640 (15.5)	13,503 (13.4)	2,345 (2.3)	7,661 (7.6)	6,669 (6.6)	3,974 (3.9)	2,416 (2.4)	1,413 (1.4)	857 (0.8)	1,343 (1.3)	101,109 (100.0)	10,771	111,880	5.20	1.42
合計 (%)	10,960 (3.9)	13,357 (4.7)	23,101 (8.2)	34,691 (12.3)	41,537 (14.7)	43,198 (15.3)	37,612 (13.3)	6,429 (2.3)	21,984 (7.8)	19,279 (6.8)	12,026 (4.2)	7,405 (2.6)	4,483 (1.6)	2,696 (1.0)	4,361 (1.5)	283,119 (100.0)	30,098	313,217	5.25	1.44
記載なし (%)																				
総計 (%)	10,960 (3.9)	13,357 (4.7)	23,101 (8.2)	34,691 (12.3)	41,537 (14.7)	43,198 (15.3)	37,612 (13.3)	6,429 (2.3)	21,984 (7.8)	19,279 (6.8)	12,026 (4.2)	7,405 (2.6)	4,483 (1.6)	2,696 (1.0)	4,361 (1.5)	283,119 (100.0)	30,098	313,217	5.25	1.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査