

表 2943 透析前リン濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	5,325 (3.8)	6,919 (4.9)	11,469 (8.2)	17,063 (12.2)	20,473 (14.6)	21,339 (15.2)	18,575 (13.2)	3,111 (2.2)	10,772 (7.7)	9,530 (6.8)	6,110 (4.4)	3,760 (2.7)	2,311 (1.6)	1,401 (1.0)	2,260 (1.6)	140,418 (100.0)	4,022	144,440	5.26	1.45
女性 (%)	3,483 (4.5)	3,643 (4.7)	6,569 (8.5)	9,737 (12.6)	11,549 (15.0)	11,802 (15.3)	10,255 (13.3)	1,743 (2.3)	5,843 (7.6)	5,006 (6.5)	3,016 (3.9)	1,812 (2.3)	1,041 (1.3)	647 (0.8)	1,020 (1.3)	77,166 (100.0)	2,246	79,412	5.18	1.42
合計 (%)	8,808 (4.0)	10,562 (4.9)	18,038 (8.3)	26,800 (12.3)	32,022 (14.7)	33,141 (15.2)	28,830 (13.3)	4,854 (2.2)	16,615 (7.6)	14,536 (6.7)	9,126 (4.2)	5,572 (2.6)	3,352 (1.5)	2,048 (0.9)	3,280 (1.5)	217,584 (100.0)	6,268	223,852	5.23	1.44
記載なし (%)																				
総計 (%)	8,808 (4.0)	10,562 (4.9)	18,038 (8.3)	26,800 (12.3)	32,022 (14.7)	33,141 (15.2)	28,830 (13.3)	4,854 (2.2)	16,615 (7.6)	14,536 (6.7)	9,126 (4.2)	5,572 (2.6)	3,352 (1.5)	2,048 (0.9)	3,280 (1.5)	217,584 (100.0)	6,268	223,852	5.23	1.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査