

表 2957 透析前リン濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	838 (2.7)	1,166 (3.8)	2,138 (6.9)	3,490 (11.3)	4,356 (14.1)	4,626 (15.0)	4,243 (13.8)	764 (2.5)	2,719 (8.8)	2,383 (7.7)	1,555 (5.0)	973 (3.2)	599 (1.9)	363 (1.2)	606 (2.0)	30,819 (100.0)	811	31,630	5.43	1.45
女性 (%)	564 (3.2)	678 (3.9)	1,283 (7.3)	2,040 (11.7)	2,583 (14.8)	2,850 (16.3)	2,437 (13.9)	460 (2.6)	1,360 (7.8)	1,295 (7.4)	748 (4.3)	471 (2.7)	298 (1.7)	162 (0.9)	252 (1.4)	17,481 (100.0)	470	17,951	5.32	1.40
合計 (%)	1,402 (2.9)	1,844 (3.8)	3,421 (7.1)	5,530 (11.4)	6,939 (14.4)	7,476 (15.5)	6,680 (13.8)	1,224 (2.5)	4,079 (8.4)	3,678 (7.6)	2,303 (4.8)	1,444 (3.0)	897 (1.9)	525 (1.1)	858 (1.8)	48,300 (100.0)	1,281	49,581	5.39	1.43
記載なし (%)																				
総計 (%)	1,402 (2.9)	1,844 (3.8)	3,421 (7.1)	5,530 (11.4)	6,939 (14.4)	7,476 (15.5)	6,680 (13.8)	1,224 (2.5)	4,079 (8.4)	3,678 (7.6)	2,303 (4.8)	1,444 (3.0)	897 (1.9)	525 (1.1)	858 (1.8)	48,300 (100.0)	1,281	49,581	5.39	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査