

表 2971 リン濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	98 (2.5)	163 (4.2)	337 (8.7)	528 (13.7)	574 (14.9)	647 (16.8)	500 (12.9)	84 (2.2)	314 (8.1)	260 (6.7)	150 (3.9)	87 (2.3)	55 (1.4)	20 (0.5)	45 (1.2)	3,862 (100.0)	1,812	5,674	5.22	1.34
女性 (%)	45 (2.1)	74 (3.5)	173 (8.1)	321 (15.1)	390 (18.4)	347 (16.3)	270 (12.7)	62 (2.9)	153 (7.2)	129 (6.1)	69 (3.3)	45 (2.1)	21 (1.0)	9 (0.4)	15 (0.7)	2,123 (100.0)	972	3,095	5.15	1.23
合計 (%)	143 (2.4)	237 (4.0)	510 (8.5)	849 (14.2)	964 (16.1)	994 (16.6)	770 (12.9)	146 (2.4)	467 (7.8)	389 (6.5)	219 (3.7)	132 (2.2)	76 (1.3)	29 (0.5)	60 (1.0)	5,985 (100.0)	2,784	8,769	5.20	1.30
記載なし (%)																				
総計 (%)	143 (2.4)	237 (4.0)	510 (8.5)	849 (14.2)	964 (16.1)	994 (16.6)	770 (12.9)	146 (2.4)	467 (7.8)	389 (6.5)	219 (3.7)	132 (2.2)	76 (1.3)	29 (0.5)	60 (1.0)	5,985 (100.0)	2,784	8,769	5.20	1.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査