

表 2988 PTH値(pg/mL) 性別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

| 性別          | 20未満            | 20～             | 40～             | 60～             | 80～             | 100～            | 120～            | 140～            | 160～            | 180～             | 240～         | 241～            | 300～            | 360～           | 420～           | 480～           | 500～           | 540～           | 600～           | 800～           | 合計                 | 記載なし  | 総計      | 平均     | 標準偏差   |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|---------|--------|--------|
| 男性<br>(%)   | 6.327<br>(4.0)  | 9.910<br>(6.3)  | 10.917<br>(7.0) | 11.830<br>(7.6) | 12.502<br>(8.0) | 12.335<br>(7.9) | 12.025<br>(7.7) | 11.201<br>(7.2) | 10.358<br>(6.6) | 23.824<br>(15.2) | 291<br>(0.2) | 13,909<br>(8.9) | 8,041<br>(5.1)  | 4,527<br>(2.9) | 2,633<br>(1.7) | 659<br>(0.4)   | 977<br>(0.6)   | 1,070<br>(0.7) | 1,773<br>(1.1) | 1,287<br>(0.8) | 156,396<br>(100.0) | 3,856 | 160,252 | 176.72 | 160.14 |
| 女性<br>(%)   | 4.162<br>(4.8)  | 5.975<br>(6.9)  | 6.441<br>(7.4)  | 6.900<br>(7.9)  | 6.926<br>(7.9)  | 6.687<br>(7.7)  | 6.388<br>(7.3)  | 5.880<br>(6.7)  | 5.258<br>(6.0)  | 12.017<br>(13.8) | 158<br>(0.2) | 7,349<br>(8.4)  | 4,381<br>(5.0)  | 2,613<br>(3.0) | 1,671<br>(1.9) | 420<br>(0.5)   | 666<br>(0.8)   | 749<br>(0.9)   | 1,345<br>(1.5) | 1,220<br>(1.4) | 87,206<br>(100.0)  | 2,095 | 89,301  | 183.87 | 190.84 |
| 合計<br>(%)   | 10,489<br>(4.3) | 15,885<br>(6.5) | 17,358<br>(7.1) | 18,730<br>(7.7) | 19,428<br>(8.0) | 19,022<br>(7.8) | 18,413<br>(7.6) | 17,081<br>(7.0) | 15,616<br>(6.4) | 35,841<br>(14.7) | 449<br>(0.2) | 21,258<br>(8.7) | 12,422<br>(5.1) | 7,140<br>(2.9) | 4,304<br>(1.8) | 1,079<br>(0.4) | 1,643<br>(0.7) | 1,819<br>(0.7) | 3,118<br>(1.3) | 2,507<br>(1.0) | 243,602<br>(100.0) | 5,951 | 249,553 | 179.28 | 171.80 |
| 記載なし<br>(%) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |              |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |                    |       |         |        |        |
| 総計<br>(%)   | 10,489<br>(4.3) | 15,885<br>(6.5) | 17,358<br>(7.1) | 18,730<br>(7.7) | 19,428<br>(8.0) | 19,022<br>(7.8) | 18,413<br>(7.6) | 17,081<br>(7.0) | 15,616<br>(6.4) | 35,841<br>(14.7) | 449<br>(0.2) | 21,258<br>(8.7) | 12,422<br>(5.1) | 7,140<br>(2.9) | 4,304<br>(1.8) | 1,079<br>(0.4) | 1,643<br>(0.7) | 1,819<br>(0.7) | 3,118<br>(1.3) | 2,507<br>(1.0) | 243,602<br>(100.0) | 5,951 | 249,553 | 179.28 | 171.80 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査