

表 3040 PTH値(pg/mL) 治療方法別（透析患者全体）PTH測定法:whole-PTH

治療方法	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	1,507 (9.1)	1,845 (11.2)	1,688 (10.2)	2,598 (15.7)	2,270 (13.8)	1,796 (10.9)	1,268 (7.7)	41 (0.2)	1,028 (6.2)	703 (4.3)	463 (2.8)	557 (3.4)	217 (1.3)	154 (0.9)	159 (1.0)	207 (1.3)	16,501 (100.0)	629	17,130	108.50	114.02
血液透析濾過 （％）	273 (7.6)	353 (9.9)	390 (10.9)	579 (16.2)	529 (14.8)	395 (11.0)	256 (7.2)	6 (0.2)	241 (6.7)	139 (3.9)	99 (2.8)	118 (3.3)	56 (1.6)	37 (1.0)	50 (1.4)	58 (1.6)	3,579 (100.0)	145	3,724	114.06	125.68
血液濾過 （％）			1 (100.0)														1 (100.0)		1	49.00	
血液吸着透析 （％）	19 (16.5)	19 (16.5)	8 (7.0)	21 (18.3)	13 (11.3)	12 (10.4)	11 (9.6)		6 (5.2)	1 (0.9)	2 (1.7)				1 (0.9)	2 (1.7)	115 (100.0)	7	122	83.37	92.77
在宅血液透析 （％）	3 (5.2)	8 (13.8)	5 (8.6)	12 (20.7)	9 (15.5)	2 (3.4)	3 (5.2)		6 (10.3)	3 (5.2)	2 (3.4)	2 (3.4)				3 (5.2)	58 (100.0)	1	59	124.63	151.17
腹膜透析 （％）	50 (7.6)	57 (8.6)	56 (8.5)	105 (15.9)	76 (11.5)	72 (10.9)	56 (8.5)	1 (0.2)	48 (7.3)	31 (4.7)	26 (3.9)	28 (4.2)	17 (2.6)	7 (1.1)	13 (2.0)	16 (2.4)	659 (100.0)	39	698	131.55	136.03
合計 （％）	1,852 (8.9)	2,282 (10.9)	2,148 (10.3)	3,315 (15.9)	2,897 (13.9)	2,277 (10.9)	1,594 (7.6)	48 (0.2)	1,329 (6.4)	877 (4.2)	592 (2.8)	705 (3.4)	290 (1.4)	198 (0.9)	223 (1.1)	286 (1.4)	20,913 (100.0)	821	21,734	110.08	116.94
記載なし （％）																					
総計 （％）	1,852 (8.9)	2,282 (10.9)	2,148 (10.3)	3,315 (15.9)	2,897 (13.9)	2,277 (10.9)	1,594 (7.6)	48 (0.2)	1,329 (6.4)	877 (4.2)	592 (2.8)	705 (3.4)	290 (1.4)	198 (0.9)	223 (1.1)	286 (1.4)	20,913 (100.0)	821	21,734	110.08	116.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査