

表 3043 PTH値(pg/mL) 性別（透析患者全体）PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1,086	1,401	1,413	2,175	1,964	1,514	1,043	31	908	586	389	431	175	117	131	164	13,528	531	14,059	108.95	109.11
(%)	(8.0)	(10.4)	(10.4)	(16.1)	(14.5)	(11.2)	(7.7)	(0.2)	(6.7)	(4.3)	(2.9)	(3.2)	(1.3)	(0.9)	(1.0)	(1.2)	(100.0)				
女性	766	881	735	1,140	933	763	551	17	421	291	203	274	115	81	92	122	7,385	290	7,675	112.16	130.07
(%)	(10.4)	(11.9)	(10.0)	(15.4)	(12.6)	(10.3)	(7.5)	(0.2)	(5.7)	(3.9)	(2.7)	(3.7)	(1.6)	(1.1)	(1.2)	(1.7)	(100.0)				
合計	1,852	2,282	2,148	3,315	2,897	2,277	1,594	48	1,329	877	592	705	290	198	223	286	20,913	821	21,734	110.08	116.94
(%)	(8.9)	(10.9)	(10.3)	(15.9)	(13.9)	(10.9)	(7.6)	(0.2)	(6.4)	(4.2)	(2.8)	(3.4)	(1.4)	(0.9)	(1.1)	(1.4)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	1,852	2,282	2,148	3,315	2,897	2,277	1,594	48	1,329	877	592	705	290	198	223	286	20,913	821	21,734	110.08	116.94
(%)	(8.9)	(10.9)	(10.3)	(15.9)	(13.9)	(10.9)	(7.6)	(0.2)	(6.4)	(4.2)	(2.8)	(3.4)	(1.4)	(0.9)	(1.1)	(1.4)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査