

表 3048 PTH値(pg/mL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	868	1,118	1,071	1,662	1,512	1,180	795	26	692	445	300	326	126	87	94	115	10,417	376	10,793	107.19	105.92
(%)	(8.3)	(10.7)	(10.3)	(16.0)	(14.5)	(11.3)	(7.6)	(0.2)	(6.6)	(4.3)	(2.9)	(3.1)	(1.2)	(0.8)	(0.9)	(1.1)	(100.0)				
女性	592	687	560	862	712	574	436	15	314	233	152	219	86	60	61	87	5,650	200	5,850	110.76	124.44
(%)	(10.5)	(12.2)	(9.9)	(15.3)	(12.6)	(10.2)	(7.7)	(0.3)	(5.6)	(4.1)	(2.7)	(3.9)	(1.5)	(1.1)	(1.1)	(1.5)	(100.0)				
合計	1,460	1,805	1,631	2,524	2,224	1,754	1,231	41	1,006	678	452	545	212	147	155	202	16,067	576	16,643	108.45	112.79
(%)	(9.1)	(11.2)	(10.2)	(15.7)	(13.8)	(10.9)	(7.7)	(0.3)	(6.3)	(4.2)	(2.8)	(3.4)	(1.3)	(0.9)	(1.0)	(1.3)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	1,460	1,805	1,631	2,524	2,224	1,754	1,231	41	1,006	678	452	545	212	147	155	202	16,067	576	16,643	108.45	112.79
(%)	(9.1)	(11.2)	(10.2)	(15.7)	(13.8)	(10.9)	(7.7)	(0.3)	(6.3)	(4.2)	(2.8)	(3.4)	(1.3)	(0.9)	(1.0)	(1.3)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査