

表 3053 PTH値(pg/mL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	144	194	261	371	356	249	177	4	164	99	64	78	30	21	29	34	2,275	77	2,352	114.72	119.83
(%)	(6.3)	(8.5)	(11.5)	(16.3)	(15.6)	(10.9)	(7.8)	(0.2)	(7.2)	(4.4)	(2.8)	(3.4)	(1.3)	(0.9)	(1.3)	(1.5)	(100.0)				
女性	120	145	121	187	166	137	75	2	73	37	33	40	25	16	20	23	1,220	54	1,274	114.74	137.88
(%)	(9.8)	(11.9)	(9.9)	(15.3)	(13.6)	(11.2)	(6.1)	(0.2)	(6.0)	(3.0)	(2.7)	(3.3)	(2.0)	(1.3)	(1.6)	(1.9)	(100.0)				
合計	264	339	382	558	522	386	252	6	237	136	97	118	55	37	49	57	3,495	131	3,626	114.72	126.40
(%)	(7.6)	(9.7)	(10.9)	(16.0)	(14.9)	(11.0)	(7.2)	(0.2)	(6.8)	(3.9)	(2.8)	(3.4)	(1.6)	(1.1)	(1.4)	(1.6)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	264	339	382	558	522	386	252	6	237	136	97	118	55	37	49	57	3,495	131	3,626	114.72	126.40
(%)	(7.6)	(9.7)	(10.9)	(16.0)	(14.9)	(11.0)	(7.2)	(0.2)	(6.8)	(3.9)	(2.8)	(3.4)	(1.6)	(1.1)	(1.4)	(1.6)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査