

表 3063 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	219 (0.1)	387 (0.2)	960 (0.4)	3,512 (1.6)	11,682 (5.2)	36,375 (16.2)	75,469 (33.6)	63,774 (28.4)	24,012 (10.7)	6,047 (2.7)	2,155 (1.0)	224,592 (100.0)	24,133	248,725	10.72	1.29
血液透析濾過 （％）	34 (0.1)	43 (0.1)	118 (0.2)	513 (1.0)	1,872 (3.8)	7,058 (14.3)	16,532 (33.6)	15,011 (30.5)	5,781 (11.7)	1,582 (3.2)	660 (1.3)	49,204 (100.0)	4,572	53,776	10.88	1.24
血液濾過 （％）		1 (8.3)		2 (16.7)	2 (16.7)		4 (33.3)	3 (25.0)				12 (100.0)	4	16	9.54	1.91
血液吸着透析 （％）		1 (0.1)	5 (0.4)	21 (1.6)	66 (5.0)	239 (18.2)	433 (33.0)	385 (29.3)	130 (9.9)	23 (1.8)	10 (0.8)	1,313 (100.0)	63	1,376	10.67	1.20
在宅血液透析 （％）		3 (0.7)	2 (0.5)		14 (3.2)	45 (10.3)	102 (23.3)	126 (28.8)	81 (18.5)	42 (9.6)	23 (5.3)	438 (100.0)	117	555	11.43	1.56
腹膜透析 （％）	2 (0.0)	5 (0.1)	39 (0.7)	97 (1.6)	361 (6.1)	954 (16.0)	1,703 (28.6)	1,679 (28.2)	802 (13.5)	230 (3.9)	83 (1.4)	5,955 (100.0)	2,814	8,769	10.83	1.39
合計 （％）	255 (0.1)	440 (0.2)	1,124 (0.4)	4,145 (1.5)	13,997 (5.0)	44,671 (15.9)	94,243 (33.5)	80,978 (28.8)	30,806 (10.9)	7,924 (2.8)	2,931 (1.0)	281,514 (100.0)	31,703	313,217	10.75	1.28
記載なし （％）																
総計 （％）	255 (0.1)	440 (0.2)	1,124 (0.4)	4,145 (1.5)	13,997 (5.0)	44,671 (15.9)	94,243 (33.5)	80,978 (28.8)	30,806 (10.9)	7,924 (2.8)	2,931 (1.0)	281,514 (100.0)	31,703	313,217	10.75	1.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査