

表 3066 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別（透析患者全体）

| 性別   | 5未満   | 5～    | 6～    | 7～    | 8～     | 9～     | 10～    | 11～    | 12～    | 13～   | 14～   | 合計      | 記載なし   | 総計      | 平均    | 標準偏差 |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|
| 男性   | 161   | 263   | 670   | 2,546 | 8,328  | 26,933 | 59,343 | 53,436 | 21,291 | 5,727 | 2,290 | 180,988 | 20,349 | 201,337 | 10.82 | 1.30 |
| (%)  | (0.1) | (0.1) | (0.4) | (1.4) | (4.6)  | (14.9) | (32.8) | (29.5) | (11.8) | (3.2) | (1.3) | (100.0) |        |         |       |      |
| 女性   | 94    | 177   | 454   | 1,599 | 5,669  | 17,738 | 34,900 | 27,542 | 9,515  | 2,197 | 641   | 100,526 | 11,354 | 111,880 | 10.64 | 1.25 |
| (%)  | (0.1) | (0.2) | (0.5) | (1.6) | (5.6)  | (17.6) | (34.7) | (27.4) | (9.5)  | (2.2) | (0.6) | (100.0) |        |         |       |      |
| 合計   | 255   | 440   | 1,124 | 4,145 | 13,997 | 44,671 | 94,243 | 80,978 | 30,806 | 7,924 | 2,931 | 281,514 | 31,703 | 313,217 | 10.75 | 1.28 |
| (%)  | (0.1) | (0.2) | (0.4) | (1.5) | (5.0)  | (15.9) | (33.5) | (28.8) | (10.9) | (2.8) | (1.0) | (100.0) |        |         |       |      |
| 記載なし |       |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |         |        |         |       |      |
| (%)  |       |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |         |        |         |       |      |
| 総計   | 255   | 440   | 1,124 | 4,145 | 13,997 | 44,671 | 94,243 | 80,978 | 30,806 | 7,924 | 2,931 | 281,514 | 31,703 | 313,217 | 10.75 | 1.28 |
| (%)  | (0.1) | (0.2) | (0.4) | (1.5) | (5.0)  | (15.9) | (33.5) | (28.8) | (10.9) | (2.8) | (1.0) | (100.0) |        |         |       |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査