

表 3067 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			1 (1.4)	2 (2.7)	5 (6.8)	9 (12.3)	19 (26.0)	19 (26.0)	17 (23.3)	1 (1.4)		73 (100.0)	30	103	10.86	1.46
15歳～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	5 (0.6)	8 (1.0)	41 (4.9)	105 (12.5)	240 (28.5)	269 (32.0)	114 (13.6)	40 (4.8)	17 (2.0)	841 (100.0)	129	970	10.97	1.37
30歳～ (%)	7 (0.1)	15 (0.1)	44 (0.4)	140 (1.1)	453 (3.6)	1,488 (12.0)	3,770 (30.3)	3,993 (32.1)	1,776 (14.3)	530 (4.3)	220 (1.8)	12,436 (100.0)	1,420	13,856	11.01	1.31
45歳～ (%)	50 (0.1)	77 (0.2)	153 (0.3)	521 (1.0)	1,824 (3.6)	6,616 (13.1)	16,086 (31.7)	15,786 (31.1)	6,686 (13.2)	2,010 (4.0)	881 (1.7)	50,690 (100.0)	5,651	56,341	10.96	1.30
60歳～ (%)	93 (0.1)	199 (0.2)	493 (0.4)	1,779 (1.4)	6,109 (4.8)	19,957 (15.6)	42,987 (33.7)	37,275 (29.2)	13,981 (11.0)	3,463 (2.7)	1,325 (1.0)	127,661 (100.0)	13,973	141,634	10.77	1.27
75歳～ (%)	101 (0.1)	138 (0.2)	405 (0.5)	1,570 (1.9)	5,197 (6.1)	15,475 (18.2)	29,411 (34.7)	22,458 (26.5)	7,850 (9.3)	1,787 (2.1)	472 (0.6)	84,864 (100.0)	9,884	94,748	10.59	1.26
90歳～ (%)	3 (0.1)	10 (0.2)	23 (0.5)	125 (2.5)	368 (7.4)	1,019 (20.6)	1,730 (35.0)	1,178 (23.8)	382 (7.7)	93 (1.9)	16 (0.3)	4,947 (100.0)	613	5,560	10.45	1.26
合計 (%)	255 (0.1)	440 (0.2)	1,124 (0.4)	4,145 (1.5)	13,997 (5.0)	44,669 (15.9)	94,243 (33.5)	80,978 (28.8)	30,806 (10.9)	7,924 (2.8)	2,931 (1.0)	281,512 (100.0)	31,700	313,212	10.75	1.28
不明 (%)						2 (100.0)						2 (100.0)	2	4	9.60	0.28
記載なし (%)													1	1		
総計 (%)	255 (0.1)	440 (0.2)	1,124 (0.4)	4,145 (1.5)	13,997 (5.0)	44,671 (15.9)	94,243 (33.5)	80,978 (28.8)	30,806 (10.9)	7,924 (2.8)	2,931 (1.0)	281,514 (100.0)	31,703	313,217	10.75	1.28
平均	69.28	68.48	69.34	70.61	70.32	69.53	68.30	66.99	65.96	64.63	62.45	67.84	68.03	67.86		
標準偏差	12.43	12.23	12.53	12.20	12.17	12.14	12.24	12.48	12.75	12.92	12.50	12.46	12.82	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査