

表 3078 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	135	225	534	2,024	6,590	21,257	46,117	40,873	16,046	4,209	1,611	139,621	4,819	144,440	10.79	1.29
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(1.4)	(4.7)	(15.2)	(33.0)	(29.3)	(11.5)	(3.0)	(1.2)	(100.0)				
女性	79	143	362	1,257	4,426	13,631	26,827	20,829	7,093	1,592	453	76,692	2,720	79,412	10.62	1.25
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(1.6)	(5.8)	(17.8)	(35.0)	(27.2)	(9.2)	(2.1)	(0.6)	(100.0)				
合計	214	368	896	3,281	11,016	34,888	72,944	61,702	23,139	5,801	2,064	216,313	7,539	223,852	10.73	1.28
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(1.5)	(5.1)	(16.1)	(33.7)	(28.5)	(10.7)	(2.7)	(1.0)	(100.0)				
記載なし																
(%)																
総計	214	368	896	3,281	11,016	34,888	72,944	61,702	23,139	5,801	2,064	216,313	7,539	223,852	10.73	1.28
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(1.5)	(5.1)	(16.1)	(33.7)	(28.5)	(10.7)	(2.7)	(1.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査