

表 3079 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

年齢	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)						2 (20.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	2 (20.0)			10 (100.0)		10	11.07	1.07
15歳～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.4)	7 (1.3)	29 (5.3)	68 (12.4)	154 (28.0)	183 (33.3)	75 (13.6)	20 (3.6)	10 (1.8)	550 (100.0)	27	577	10.93	1.36
30歳～ (%)	6 (0.1)	10 (0.1)	34 (0.4)	114 (1.3)	319 (3.7)	1,081 (12.4)	2,679 (30.7)	2,767 (31.8)	1,201 (13.8)	362 (4.2)	140 (1.6)	8,713 (100.0)	291	9,004	10.97	1.31
45歳～ (%)	41 (0.1)	60 (0.2)	125 (0.3)	381 (1.0)	1,348 (3.7)	4,817 (13.2)	11,611 (31.9)	11,274 (31.0)	4,720 (13.0)	1,397 (3.8)	586 (1.6)	36,360 (100.0)	1,210	37,570	10.93	1.30
60歳～ (%)	78 (0.1)	165 (0.2)	381 (0.4)	1,403 (1.4)	4,748 (4.9)	15,462 (15.8)	33,124 (33.9)	28,274 (28.9)	10,573 (10.8)	2,557 (2.6)	962 (1.0)	97,727 (100.0)	3,215	100,942	10.75	1.26
75歳～ (%)	85 (0.1)	124 (0.2)	337 (0.5)	1,278 (1.9)	4,267 (6.2)	12,628 (18.3)	23,951 (34.7)	18,256 (26.5)	6,270 (9.1)	1,397 (2.0)	355 (0.5)	68,948 (100.0)	2,617	71,565	10.58	1.26
90歳～ (%)	3 (0.1)	8 (0.2)	17 (0.4)	98 (2.4)	305 (7.6)	828 (20.7)	1,422 (35.5)	945 (23.6)	298 (7.4)	68 (1.7)	11 (0.3)	4,003 (100.0)	177	4,180	10.44	1.25
合計 (%)	214 (0.1)	368 (0.2)	896 (0.4)	3,281 (1.5)	11,016 (5.1)	34,886 (16.1)	72,944 (33.7)	61,702 (28.5)	23,139 (10.7)	5,801 (2.7)	2,064 (1.0)	216,311 (100.0)	7,537	223,848	10.73	1.28
不明 (%)						2 (100.0)						2 (100.0)	1	3	9.60	0.28
記載なし (%)													1	1		
総計 (%)	214 (0.1)	368 (0.2)	896 (0.4)	3,281 (1.5)	11,016 (5.1)	34,888 (16.1)	72,944 (33.7)	61,702 (28.5)	23,139 (10.7)	5,801 (2.7)	2,064 (1.0)	216,313 (100.0)	7,539	223,852	10.73	1.28
平均	69.29	69.08	69.66	70.91	70.83	70.05	68.89	67.65	66.63	65.26	63.14	68.46	69.26	68.49		
標準偏差	12.53	12.00	12.17	12.08	11.94	11.97	12.08	12.34	12.53	12.79	12.30	12.28	12.55	12.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査