

表 3081 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	73 (0.1)	103 (0.2)	219 (0.4)	814 (1.3)	2,832 (4.6)	9,700 (15.8)	20,932 (34.1)	17,874 (29.1)	6,715 (10.9)	1,617 (2.6)	556 (0.9)	61,435 (100.0)	2,039	63,474	10.75	1.26
慢性腎盂腎炎 (%)	1 (0.1)	2 (0.1)	5 (0.3)	41 (2.1)	109 (5.5)	348 (17.5)	673 (33.9)	538 (27.1)	207 (10.4)	46 (2.3)	16 (0.8)	1,986 (100.0)	54	2,040	10.67	1.26
急速進行性糸球体腎炎 (%)	2 (0.1)	2 (0.1)	7 (0.4)	26 (1.5)	106 (6.2)	265 (15.4)	574 (33.4)	490 (28.5)	179 (10.4)	54 (3.1)	13 (0.8)	1,718 (100.0)	53	1,771	10.71	1.29
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		2 (0.2)	4 (0.4)	12 (1.3)	48 (5.0)	152 (15.9)	335 (35.0)	286 (29.9)	100 (10.4)	11 (1.1)	7 (0.7)	957 (100.0)	24	981	10.71	1.18
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	8 (0.9)	15 (1.7)	42 (4.7)	124 (13.7)	320 (35.4)	260 (28.8)	97 (10.7)	24 (2.7)	10 (1.1)	903 (100.0)	26	929	10.74	1.33
多発性嚢胞腎 (%)	6 (0.1)	13 (0.2)	11 (0.1)	82 (1.1)	288 (3.7)	1,036 (13.3)	2,551 (32.8)	2,397 (30.8)	1,007 (12.9)	251 (3.2)	144 (1.8)	7,786 (100.0)	230	8,016	10.94	1.28
腎硬化症 (%)	22 (0.1)	33 (0.2)	93 (0.4)	345 (1.6)	1,124 (5.3)	3,531 (16.6)	7,373 (34.6)	6,043 (28.4)	2,102 (9.9)	485 (2.3)	150 (0.7)	21,301 (100.0)	706	22,007	10.68	1.25
悪性高血圧 (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	8 (0.4)	17 (0.9)	100 (5.6)	287 (16.0)	561 (31.3)	557 (31.0)	194 (10.8)	48 (2.7)	20 (1.1)	1,794 (100.0)	67	1,861	10.78	1.26
糖尿病性腎症 (%)	91 (0.1)	158 (0.2)	365 (0.4)	1,334 (1.5)	4,486 (5.2)	14,167 (16.4)	28,988 (33.5)	24,300 (28.1)	9,290 (10.7)	2,453 (2.8)	885 (1.0)	86,517 (100.0)	2,909	89,426	10.73	1.29
SLE腎炎 (%)	2 (0.1)	3 (0.2)	6 (0.4)	21 (1.5)	92 (6.4)	249 (17.3)	494 (34.3)	387 (26.9)	139 (9.7)	36 (2.5)	10 (0.7)	1,439 (100.0)	65	1,504	10.64	1.27
アミロイド腎 (%)			4 (1.3)	5 (1.7)	18 (6.0)	59 (19.7)	83 (27.7)	85 (28.3)	36 (12.0)	7 (2.3)	3 (1.0)	300 (100.0)	14	314	10.68	1.34
痛風腎 (%)	1 (0.1)		5 (0.7)	9 (1.2)	42 (5.5)	109 (14.4)	244 (32.1)	234 (30.8)	85 (11.2)	20 (2.6)	10 (1.3)	759 (100.0)	19	778	10.78	1.31
先天性代謝異常による腎不全 (%)		1 (0.6)		3 (1.8)	12 (7.1)	31 (18.5)	48 (28.6)	46 (27.4)	17 (10.1)	6 (3.6)	4 (2.4)	168 (100.0)	5	173	10.72	1.46
腎・尿路結核 (%)	1 (0.7)	1 (0.7)	2 (1.5)	3 (2.2)	8 (5.9)	32 (23.5)	38 (27.9)	41 (30.1)	9 (6.6)		1 (0.7)	136 (100.0)	5	141	10.36	1.38
腎・尿路結石 (%)	1 (0.2)		3 (0.7)	7 (1.7)	26 (6.4)	61 (14.9)	139 (34.0)	119 (29.1)	43 (10.5)	5 (1.2)	5 (1.2)	409 (100.0)	12	421	10.64	1.31
腎・尿路腫瘍 (%)			3 (0.5)	28 (4.2)	46 (7.0)	124 (18.8)	220 (33.4)	169 (25.6)	55 (8.3)	7 (1.1)	7 (1.1)	659 (100.0)	19	678	10.45	1.33
閉塞性尿路障害 (%)		1 (0.2)	4 (0.8)	6 (1.3)	27 (5.7)	70 (14.7)	162 (34.0)	127 (26.7)	60 (12.6)	17 (3.6)	2 (0.4)	476 (100.0)	18	494	10.76	1.30
骨髄腫 (%)			5 (2.7)	14 (7.7)	28 (15.4)	34 (18.7)	50 (27.5)	33 (18.1)	16 (8.8)	2 (1.1)		182 (100.0)	8	190	9.98	1.51
腎形成不全 (%)			2 (0.5)	6 (1.5)	19 (4.8)	45 (11.5)	127 (32.3)	124 (31.6)	46 (11.7)	17 (4.3)	7 (1.8)	393 (100.0)	7	400	10.93	1.33
不明 (%)	8 (0.0)	32 (0.2)	107 (0.5)	349 (1.7)	1,189 (5.9)	3,351 (16.6)	6,791 (33.6)	5,673 (28.1)	2,030 (10.1)	498 (2.5)	156 (0.8)	20,184 (100.0)	992	21,176	10.67	1.27
再導入 (%)		4 (0.3)	4 (0.3)	20 (1.5)	59 (4.5)	210 (15.9)	423 (32.1)	391 (29.7)	150 (11.4)	44 (3.3)	13 (1.0)	1,318 (100.0)	38	1,356	10.81	1.27
その他 (%)	4 (0.1)	10 (0.2)	31 (0.6)	123 (2.2)	315 (5.7)	901 (16.4)	1,817 (33.1)	1,527 (27.8)	561 (10.2)	153 (2.8)	45 (0.8)	5,487 (100.0)	228	5,715	10.68	1.32
合計 (%)	214 (0.1)	368 (0.2)	896 (0.4)	3,280 (1.5)	11,016 (5.1)	34,886 (16.1)	72,943 (33.7)	61,701 (28.5)	23,138 (10.7)	5,801 (2.7)	2,064 (1.0)	216,307 (100.0)	7,538	223,845	10.73	1.28
記載なし (%)				1 (16.7)		2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)			6 (100.0)	1	7	10.15	1.66
総計 (%)	214 (0.1)	368 (0.2)	896 (0.4)	3,281 (1.5)	11,016 (5.1)	34,888 (16.1)	72,944 (33.7)	61,702 (28.5)	23,139 (10.7)	5,801 (2.7)	2,064 (1.0)	216,313 (100.0)	7,539	223,852	10.73	1.28

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2015年調査