

表 3090 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	21	22	66	305	1,058	3,985	10,063	9,614	3,916	1,111	510	30,671	959	31,630	10.95	1.26
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(1.0)	(3.4)	(13.0)	(32.8)	(31.3)	(12.8)	(3.6)	(1.7)	(100.0)				
女性	13	19	48	187	757	2,879	6,103	5,112	1,734	422	131	17,405	546	17,951	10.74	1.20
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(4.3)	(16.5)	(35.1)	(29.4)	(10.0)	(2.4)	(0.8)	(100.0)				
合計	34	41	114	492	1,815	6,864	16,166	14,726	5,650	1,533	641	48,076	1,505	49,581	10.88	1.24
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(1.0)	(3.8)	(14.3)	(33.6)	(30.6)	(11.8)	(3.2)	(1.3)	(100.0)				
記載なし																
(%)																
総計	34	41	114	492	1,815	6,864	16,166	14,726	5,650	1,533	641	48,076	1,505	49,581	10.88	1.24
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(1.0)	(3.8)	(14.3)	(33.6)	(30.6)	(11.8)	(3.2)	(1.3)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査