

表 3091 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

| 年齢           | 5未満         | 5～          | 6～           | 7～           | 8～             | 9～              | 10～              | 11～              | 12～             | 13～            | 14～          | 合計                | 記載なし  | 総計     | 平均    | 標準偏差 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-------|--------|-------|------|
| 15歳未満<br>(%) |             |             |              |              |                |                 | 1<br>(100.0)     |                  |                 |                |              | 1<br>(100.0)      |       | 1      | 10.30 |      |
| 15歳～<br>(%)  |             |             |              |              | 5<br>(2.6)     | 20<br>(10.5)    | 65<br>(34.0)     | 60<br>(31.4)     | 26<br>(13.6)    | 13<br>(6.8)    | 2<br>(1.0)   | 191<br>(100.0)    | 9     | 200    | 11.10 | 1.15 |
| 30歳～<br>(%)  | 1<br>(0.0)  | 3<br>(0.1)  | 6<br>(0.2)   | 13<br>(0.5)  | 79<br>(2.8)    | 282<br>(10.0)   | 873<br>(30.9)    | 949<br>(33.6)    | 436<br>(15.4)   | 130<br>(4.6)   | 54<br>(1.9)  | 2,826<br>(100.0)  | 91    | 2,917  | 11.13 | 1.25 |
| 45歳～<br>(%)  | 6<br>(0.1)  | 6<br>(0.1)  | 14<br>(0.1)  | 92<br>(0.8)  | 295<br>(2.7)   | 1,296<br>(11.9) | 3,466<br>(31.8)  | 3,554<br>(32.6)  | 1,507<br>(13.8) | 449<br>(4.1)   | 219<br>(2.0) | 10,904<br>(100.0) | 302   | 11,206 | 11.05 | 1.25 |
| 60歳～<br>(%)  | 15<br>(0.1) | 23<br>(0.1) | 60<br>(0.3)  | 221<br>(1.0) | 892<br>(4.0)   | 3,218<br>(14.3) | 7,636<br>(34.0)  | 6,931<br>(30.9)  | 2,536<br>(11.3) | 653<br>(2.9)   | 281<br>(1.3) | 22,466<br>(100.0) | 691   | 23,157 | 10.85 | 1.23 |
| 75歳～<br>(%)  | 12<br>(0.1) | 9<br>(0.1)  | 32<br>(0.3)  | 150<br>(1.3) | 511<br>(4.6)   | 1,943<br>(17.4) | 3,945<br>(35.4)  | 3,085<br>(27.7)  | 1,104<br>(9.9)  | 271<br>(2.4)   | 81<br>(0.7)  | 11,143<br>(100.0) | 384   | 11,527 | 10.70 | 1.21 |
| 90歳～<br>(%)  |             |             | 2<br>(0.4)   | 16<br>(2.9)  | 33<br>(6.1)    | 105<br>(19.3)   | 180<br>(33.0)    | 147<br>(27.0)    | 41<br>(7.5)     | 17<br>(3.1)    | 4<br>(0.7)   | 545<br>(100.0)    | 28    | 573    | 10.56 | 1.27 |
| 合計<br>(%)    | 34<br>(0.1) | 41<br>(0.1) | 114<br>(0.2) | 492<br>(1.0) | 1,815<br>(3.8) | 6,864<br>(14.3) | 16,166<br>(33.6) | 14,726<br>(30.6) | 5,650<br>(11.8) | 1,533<br>(3.2) | 641<br>(1.3) | 48,076<br>(100.0) | 1,505 | 49,581 | 10.88 | 1.24 |
| 不明<br>(%)    |             |             |              |              |                |                 |                  |                  |                 |                |              |                   |       |        |       |      |
| 記載なし<br>(%)  |             |             |              |              |                |                 |                  |                  |                 |                |              |                   |       |        |       |      |
| 総計<br>(%)    | 34<br>(0.1) | 41<br>(0.1) | 114<br>(0.2) | 492<br>(1.0) | 1,815<br>(3.8) | 6,864<br>(14.3) | 16,166<br>(33.6) | 14,726<br>(30.6) | 5,650<br>(11.8) | 1,533<br>(3.2) | 641<br>(1.3) | 48,076<br>(100.0) | 1,505 | 49,581 | 10.88 | 1.24 |
| 平均           | 69.44       | 65.98       | 68.25        | 69.00        | 68.07          | 67.48           | 65.93            | 64.64            | 63.61           | 62.62          | 61.10        | 65.43             | 66.25 | 65.46  |       |      |
| 標準偏差         | 12.40       | 12.25       | 12.15        | 12.02        | 12.17          | 12.08           | 12.35            | 12.43            | 12.70           | 12.88          | 12.17        | 12.47             | 13.10 | 12.49  |       |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査