

表 3092 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	3 (0.0)	5 (0.1)	19 (0.3)	75 (1.2)	283 (4.6)	963 (15.6)	2,041 (33.0)	1,771 (28.6)	783 (12.7)	185 (3.0)	58 (0.9)	6,186 (100.0)	219	6,405	10.81	1.25
2年～ (%)	10 (0.1)	15 (0.1)	25 (0.2)	128 (1.2)	386 (3.6)	1,537 (14.3)	3,711 (34.5)	3,275 (30.4)	1,211 (11.3)	311 (2.9)	151 (1.4)	10,760 (100.0)	309	11,069	10.86	1.24
5年～ (%)	8 (0.1)	5 (0.0)	37 (0.3)	127 (1.0)	460 (3.7)	1,730 (14.0)	4,170 (33.8)	3,807 (30.8)	1,450 (11.7)	379 (3.1)	172 (1.4)	12,345 (100.0)	429	12,774	10.88	1.24
10年～ (%)	7 (0.1)	11 (0.1)	18 (0.2)	67 (0.9)	262 (3.6)	1,025 (13.9)	2,457 (33.4)	2,262 (30.8)	851 (11.6)	258 (3.5)	132 (1.8)	7,350 (100.0)	213	7,563	10.91	1.28
15年～ (%)	2 (0.0)	2 (0.0)	7 (0.2)	28 (0.6)	154 (3.4)	609 (13.3)	1,519 (33.2)	1,436 (31.4)	580 (12.7)	180 (3.9)	56 (1.2)	4,573 (100.0)	123	4,696	10.96	1.20
20年～ (%)		1 (0.0)	4 (0.1)	29 (1.0)	99 (3.3)	422 (14.2)	969 (32.6)	966 (32.5)	345 (11.6)	103 (3.5)	36 (1.2)	2,974 (100.0)	84	3,058	10.92	1.19
25年～ (%)	1 (0.1)		2 (0.1)	16 (0.9)	69 (3.7)	259 (13.8)	622 (33.2)	621 (33.2)	200 (10.7)	63 (3.4)	19 (1.0)	1,872 (100.0)	58	1,930	10.90	1.18
30年～ (%)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	12 (1.0)	50 (4.3)	164 (14.2)	407 (35.3)	357 (31.0)	116 (10.1)	31 (2.7)	11 (1.0)	1,152 (100.0)	45	1,197	10.80	1.20
35年～ (%)		1 (0.2)	1 (0.2)	6 (1.0)	37 (5.9)	120 (19.2)	186 (29.7)	174 (27.8)	81 (12.9)	16 (2.6)	4 (0.6)	626 (100.0)	12	638	10.75	1.26
40年～ (%)	1 (0.5)			4 (2.0)	14 (7.1)	29 (14.8)	69 (35.2)	45 (23.0)	27 (13.8)	5 (2.6)	2 (1.0)	196 (100.0)	1	197	10.67	1.36
合計 (%)	34 (0.1)	41 (0.1)	114 (0.2)	492 (1.0)	1,814 (3.8)	6,858 (14.3)	16,151 (33.6)	14,714 (30.6)	5,644 (11.8)	1,531 (3.2)	641 (1.3)	48,034 (100.0)	1,493	49,527	10.88	1.24
不明 (%)					1 (2.4)	6 (14.3)	15 (35.7)	12 (28.6)	6 (14.3)	2 (4.8)		42 (100.0)	12	54	10.97	1.03
記載なし (%)																
総計 (%)	34 (0.1)	41 (0.1)	114 (0.2)	492 (1.0)	1,815 (3.8)	6,864 (14.3)	16,166 (33.6)	14,726 (30.6)	5,650 (11.8)	1,533 (3.2)	641 (1.3)	48,076 (100.0)	1,505	49,581	10.88	1.24
平均	9.79	8.29	7.49	8.98	9.72	9.66	9.63	9.83	9.63	10.04	9.43	9.70	9.26	9.68		
標準偏差	9.74	7.83	7.00	8.95	9.34	8.94	8.66	8.66	8.68	8.47	7.71	8.71	8.49	8.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査