

表 3093 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	11 (0.1)	14 (0.1)	37 (0.2)	152 (0.9)	584 (3.4)	2,380 (14.0)	5,603 (33.0)	5,390 (31.8)	2,026 (11.9)	540 (3.2)	219 (1.3)	16,956 (100.0)	506	17,462	10.91	1.22
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (0.2)	3 (0.6)	5 (1.1)	21 (4.4)	70 (14.8)	150 (31.7)	147 (31.1)	59 (12.5)	12 (2.5)	5 (1.1)	473 (100.0)	11	484	10.82	1.26
急速進行性糸球 体腎炎 (%)			1 (0.3)	3 (0.9)	11 (3.1)	49 (14.0)	122 (34.8)	104 (29.6)	42 (12.0)	14 (4.0)	5 (1.4)	351 (100.0)	2	353	10.94	1.20
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)		1 (0.3)		4 (1.0)	20 (5.2)	59 (15.3)	130 (33.7)	113 (29.3)	44 (11.4)	11 (2.8)	4 (1.0)	386 (100.0)	15	401	10.82	1.24
その他の分類不 能の腎炎 (%)				4 (1.6)	8 (3.1)	41 (16.0)	75 (29.2)	91 (35.4)	29 (11.3)	6 (2.3)	3 (1.2)	257 (100.0)	4	261	10.87	1.18
多発性嚢胞腎 (%)		2 (0.1)	4 (0.2)	11 (0.6)	53 (2.9)	229 (12.5)	585 (31.8)	595 (32.4)	237 (12.9)	82 (4.5)	41 (2.2)	1,839 (100.0)	41	1,880	11.05	1.29
腎硬化症 (%)	6 (0.2)	2 (0.1)	8 (0.2)	42 (1.1)	140 (3.8)	543 (14.6)	1,287 (34.7)	1,130 (30.5)	399 (10.8)	103 (2.8)	50 (1.3)	3,710 (100.0)	110	3,820	10.83	1.24
悪性高血圧 (%)				6 (1.6)	9 (2.4)	66 (17.5)	116 (30.8)	112 (29.7)	53 (14.1)	10 (2.7)	5 (1.3)	377 (100.0)	14	391	10.89	1.21
糖尿病性腎症 (%)	14 (0.1)	15 (0.1)	45 (0.3)	176 (1.1)	684 (4.2)	2,380 (14.5)	5,607 (34.1)	4,825 (29.4)	1,912 (11.6)	554 (3.4)	226 (1.4)	16,438 (100.0)	522	16,960	10.86	1.26
SLE腎炎 (%)				5 (1.2)	13 (3.2)	70 (17.1)	148 (36.2)	117 (28.6)	38 (9.3)	13 (3.2)	5 (1.2)	409 (100.0)	17	426	10.79	1.18
アミロイド腎 (%)				2 (2.8)	5 (7.0)	10 (14.1)	20 (28.2)	27 (38.0)	6 (8.5)	1 (1.4)		71 (100.0)	3	74	10.68	1.21
痛風腎 (%)				2 (1.3)	1 (0.6)	27 (16.9)	56 (35.0)	51 (31.9)	15 (9.4)	6 (3.8)	2 (1.3)	160 (100.0)	6	166	10.91	1.15
先天性代謝異常 による腎不全 (%)						3 (6.4)	19 (40.4)	18 (38.3)	7 (14.9)			47 (100.0)	2	49	11.06	0.83
腎・尿路結核 (%)					3 (10.0)	4 (13.3)	7 (23.3)	12 (40.0)	4 (13.3)			30 (100.0)	1	31	10.78	1.15
腎・尿路結石 (%)					1 (1.3)	14 (18.2)	22 (28.6)	25 (32.5)	13 (16.9)	2 (2.6)		77 (100.0)	2	79	11.01	1.08
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (0.9)	6 (5.1)	16 (13.7)	41 (35.0)	34 (29.1)	13 (11.1)	3 (2.6)	3 (2.6)		117 (100.0)	2	119	10.85	1.26
閉塞性尿路障害 (%)					4 (3.9)	14 (13.6)	32 (31.1)	35 (34.0)	11 (10.7)	6 (5.8)	1 (1.0)	103 (100.0)	1	104	11.00	1.18
骨髄腫 (%)		1 (3.2)		2 (6.5)	4 (12.9)	5 (16.1)	8 (25.8)	7 (22.6)	3 (9.7)	1 (3.2)		31 (100.0)	2	33	10.16	1.74
腎形成不全 (%)					2 (1.5)	25 (18.7)	46 (34.3)	42 (31.3)	17 (12.7)	2 (1.5)		134 (100.0)	2	136	10.80	0.98
不明 (%)	3 (0.1)	1 (0.0)	11 (0.2)	57 (1.3)	182 (4.0)	629 (14.0)	1,524 (33.9)	1,393 (31.0)	533 (11.8)	117 (2.6)	50 (1.1)	4,500 (100.0)	203	4,703	10.85	1.22
再導入 (%)		1 (0.2)		2 (0.4)	11 (2.4)	67 (14.3)	169 (36.2)	133 (28.5)	64 (13.7)	13 (2.8)	7 (1.5)	467 (100.0)	16	483	10.96	1.19
その他 (%)		3 (0.3)	4 (0.4)	19 (1.7)	53 (4.7)	162 (14.2)	395 (34.7)	324 (28.5)	125 (11.0)	37 (3.3)	15 (1.3)	1,137 (100.0)	23	1,160	10.80	1.30
合計 (%)	34 (0.1)	41 (0.1)	114 (0.2)	492 (1.0)	1,815 (3.8)	6,863 (14.3)	16,162 (33.6)	14,725 (30.6)	5,650 (11.8)	1,533 (3.2)	641 (1.3)	48,070 (100.0)	1,505	49,575	10.88	1.24
記載なし (%)						1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)				6 (100.0)		6	10.33	0.37
総計 (%)	34 (0.1)	41 (0.1)	114 (0.2)	492 (1.0)	1,815 (3.8)	6,864 (14.3)	16,166 (33.6)	14,726 (30.6)	5,650 (11.8)	1,533 (3.2)	641 (1.3)	48,076 (100.0)	1,505	49,581	10.88	1.24

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査