

表 3102 ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1	3	25	60	221	568	1,091	1,110	549	158	59	3,845	1,829	5,674	10.88	1.39
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(1.6)	(5.7)	(14.8)	(28.4)	(28.9)	(14.3)	(4.1)	(1.5)	(100.0)				
女性	1	2	14	37	140	386	612	569	253	72	24	2,110	985	3,095	10.72	1.38
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(1.8)	(6.6)	(18.3)	(29.0)	(27.0)	(12.0)	(3.4)	(1.1)	(100.0)				
合計	2	5	39	97	361	954	1,703	1,679	802	230	83	5,955	2,814	8,769	10.83	1.39
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(1.6)	(6.1)	(16.0)	(28.6)	(28.2)	(13.5)	(3.9)	(1.4)	(100.0)				
記載なし																
(%)																
総計	2	5	39	97	361	954	1,703	1,679	802	230	83	5,955	2,814	8,769	10.83	1.39
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(1.6)	(6.1)	(16.0)	(28.6)	(28.2)	(13.5)	(3.9)	(1.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査