

表 3103 ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			1 (1.7)	1 (1.7)	5 (8.3)	7 (11.7)	15 (25.0)	15 (25.0)	15 (25.0)	1 (1.7)		60 (100.0)	29	89	10.88	1.50
15歳～ (%)			2 (3.0)	1 (1.5)	4 (6.0)	13 (19.4)	15 (22.4)	16 (23.9)	8 (11.9)	4 (6.0)	4 (6.0)	67 (100.0)	34	101	10.93	1.80
30歳～ (%)			2 (0.5)	5 (1.2)	23 (5.5)	61 (14.5)	104 (24.6)	133 (31.5)	69 (16.4)	16 (3.8)	9 (2.1)	422 (100.0)	238	660	10.98	1.38
45歳～ (%)	2 (0.1)	2 (0.1)	5 (0.3)	29 (1.8)	90 (5.7)	259 (16.3)	449 (28.2)	450 (28.3)	211 (13.3)	63 (4.0)	30 (1.9)	1,590 (100.0)	730	2,320	10.86	1.45
60歳～ (%)		2 (0.1)	21 (0.8)	36 (1.4)	149 (5.7)	425 (16.2)	760 (29.0)	766 (29.2)	332 (12.6)	102 (3.9)	32 (1.2)	2,625 (100.0)	1,198	3,823	10.83	1.35
75歳～ (%)		1 (0.1)	7 (0.6)	22 (2.0)	87 (7.9)	175 (15.8)	329 (29.8)	281 (25.4)	155 (14.0)	41 (3.7)	7 (0.6)	1,105 (100.0)	544	1,649	10.72	1.37
90歳～ (%)			1 (1.2)	3 (3.5)	3 (3.5)	14 (16.3)	31 (36.0)	18 (20.9)	12 (14.0)	3 (3.5)	1 (1.2)	86 (100.0)	41	127	10.70	1.36
合計 (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	39 (0.7)	97 (1.6)	361 (6.1)	954 (16.0)	1,703 (28.6)	1,679 (28.2)	802 (13.5)	230 (3.9)	83 (1.4)	5,955 (100.0)	2,814	8,769	10.83	1.39
不明 (%)																
記載なし (%)																
総計 (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	39 (0.7)	97 (1.6)	361 (6.1)	954 (16.0)	1,703 (28.6)	1,679 (28.2)	802 (13.5)	230 (3.9)	83 (1.4)	5,955 (100.0)	2,814	8,769	10.83	1.39
平均	58.00	64.00	63.56	64.07	63.90	63.03	63.55	62.45	62.12	62.66	57.51	62.87	62.64	62.80		
標準偏差		13.06	18.40	15.04	14.79	14.26	14.00	14.10	15.65	14.04	15.38	14.43	14.88	14.58		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査